

RIGIDITÉ D'EINSTEIN DU PLAN HYPERBOLIQUE COMPLEXE

YANN ROLLIN

ABSTRACT. We prove that every Einstein metric on $B^4 \subset \mathbb{C}^2$ asymptotic to the Bergman metric is equal to it up to a diffeomorphism. We need a solution of Seiberg–Witten equations in this infinite volume setting. Therefore, and more generally, if M^4 is a manifold with a CR boundary at infinity, an adapted $spin^c$ -structure which has a non zero Kronheimer–Mrowka invariant and an asymptotically complex hyperbolic Einstein metric, we produce a solution of Seiberg–Witten equations with an strong exponential decay property.

1. INTRODUCTION

Les quotients compacts lisses de l'espace hyperbolique réel $\mathbb{RH}^4$ et du plan hyperbolique complexe $\mathbb{CH}^2$ possèdent une unique métrique d'Einstein à un difféomorphisme et une constante multiplicative près. Dans le cas réel, ce résultat topologique est obtenu grâce à des techniques d'entropie [BCG]. Dans le cas complexe, Le Brun démontre ce résultat par une voie très différente utilisant les équations de Seiberg–Witten [L].

En volume infini, on sait d'après [CY] que les domaines strictement pseudo-convexes de $\mathbb{C}^n$ possèdent une unique métrique complète de Kähler-Einstein à constante et biholomorphisme près ; de façon analogue au cas compact, la question difficile de l'unicité de ces métriques en tant que métriques d'*Einstein* se pose alors.

Dans cet article, nous traitons le cas particulier de la boule unité B^4 de $\mathbb{C}^2$ munie de la métrique de Bergmann $g^{\mathcal{H}}$, qui est un modèle du plan hyperbolique complexe $\mathbb{CH}^2$. On fixe un point de la boule et on note t la distance à ce point relativement à la métrique $g^{\mathcal{H}}$; nous démontrons le théorème de rigidité suivant annoncé dans [R] :

Théorème 1. *Soit g une métrique d'Einstein sur la boule unité $B^4 \subset \mathbb{C}^2$ telle que près de l'infini on ait*

$$(1) \quad g = g^{\mathcal{H}} + e^{-\delta t} h, \quad \delta > 0$$

*et h borné en norme C^∞ relativement à $g^{\mathcal{H}}$. Alors il existe un difféomorphisme f de B^4 tel que $f^*g = g^{\mathcal{H}}$.*

Remarque : en fait, l'hypothèse sur le comportement asymptotique de g consiste, comme nous le verrons, à ne considérer que des métriques asymptotiquement hyperboliques complexes dont l'infini conforme est celui de $\mathbb{CH}^2$.

La métrique hyperbolique complexe s'exprime classiquement en coordonnées polaires comme suit : notons ρ la distance euclidienne au centre de la boule B^4 d'où un difféomorphisme $B^4 \setminus 0 \simeq]0, 1[\times S^3$. On obtient alors une 1-forme de contact η sur S^3 définie par $\eta = -Jd\rho/(2\rho)$ compatible avec le S^1 -fibré de Hopf $\pi : S^3 \rightarrow \mathbb{CP}^1$. Alors en posant $t = \arg \th \rho$, on a

$$g^{\mathcal{H}} = dt^2 + \text{sh}^2(2t)\eta^2 + \text{sh}^2(t)\gamma,$$

Date: Décembre 2001.

The author was supported by an EDGE grant, Research Training Network HPRN-CT-2000-00101, European Human Potential Programme.

où γ est la métrique de Carnot–Carathéodory sur la distribution de contact définie par $\gamma = d\eta(\cdot, J\cdot) = \pi^*g^{\text{FS}}$ avec g^{FS} la métrique de Fubini–Study sur $\mathbb{CP}^1$. En fait γ ne dépend du choix du centre de la boule qu’à un facteur conforme près et la classe conforme $[\gamma]$ est appelée *l’infini conforme* de la métrique g .

Pour chaque petite déformation de l’infini conforme $[\pi^*g^{\text{FS}}]$, Biquard construit une métrique d’Einstein asymptotiquement hyperbolique complexe sur la boule [Bi]; l’hypothèse (1) du théorème 1 est donc bien entendu nécessaire.

La difficulté principale dans la démonstration du théorème 1 est d’exhiber une solution des équations de Seiberg–Witten pour la métrique g , de volume infini, sans disposer d’un invariant défini a priori. Afin de résoudre ce problème, nous approximons dans la section 2 la métrique g par une suite de métriques g_τ au bout desquelles on a adjoint un cône asymptotiquement plat.

La théorie de Kronheimer et Mrowka [KM] fournit alors un invariant de Seiberg–Witten non nul relativement à la structure *spin^c* canonique pour les métriques g_τ . On en déduit une suite de solutions (A_τ, Φ_τ) des équations de Seiberg–Witten perturbées

$$\begin{aligned} D_{A_\tau}^{g_\tau} \Phi_\tau &= 0 \\ F_{A_\tau \otimes B_\tau^{-1}}^+ &= q(\Phi_\tau) - q(\Phi_0) + \varpi_\tau; \end{aligned}$$

ici B_τ désigne une suite de connexions asymptotiquement plates tendant vers la connexion de Chern B induite par $g^{\mathcal{H}}$ sur le fibré anti-canonique et (B, Φ_0) est la solution standard des équations pour la métrique hyperbolique complexe; ϖ_τ est une suite de 1-formes autoduales à supports compacts qui convergent vers ϖ telle que $F_B^+ = q(\Phi_0) + \varpi$. À la limite, la perturbation des équations se «détache» donc. Par ailleurs nous verrons que l’hypothèse sur le comportement asymptotique de g implique que ϖ possède une forte décroissance exponentielle. Nous démontrerons alors, que quitte à faire des changements de jauge, et à extraire une sous suite, nous pouvons faire converger (Φ_τ, A_τ) sur tout compact vers une solution (A, Φ) des équations de Seiberg–Witten non perturbées pour la métrique g

$$(2) \quad \begin{aligned} D_A^g \Phi &= 0 \\ F_A^+ &= q(\Phi), \end{aligned}$$

avec $a = A \otimes B^{-1}$ et $\varphi = \Phi - \Phi_0$ dans L_1^2 . Ce premier résultat s’obtient via un contrôle uniforme sur l’énergie des solutions (A_τ, Φ_τ) , section 3. Une méthode d’extraction similaire a permis d’obtenir un résultat de rigidité [Bi2] pour les quotients de volume fini de $\mathcal{CH}^2$, mais il n’y a pas besoin de fixer d’infini conforme dans ce cas et le résultat d’unicité concerne toutes les métriques d’Einstein. En outre il est plus facile de faire converger les solutions en volume fini, car la borne C^0 a priori obtenue sur la partie spineur des solutions donne automatiquement un premier contrôle L^2 et il n’y a donc pas besoin d’avoir recours à une énergie (cf. également [R2] pour une autre application en volume fini).

Le comportement L_1^2 à l’infini est a priori insuffisant pour donner à F_A la signification cohomologique dont nous avons besoin (cf. section 5). Comme la métrique g est d’Einstein, son comportement asymptotique est alors précisé dans les travaux d’Olivier Biquard et Marc Herzlich [BiH]. Nous en déduisons, en fixant une jauge de Coulomb près de l’infini, que a et φ en fait des $O(e^{-(4+\varepsilon)t})$ avec $\varepsilon > 0$; pour obtenir ce résultat, nous devons analyser précisément le comportement asymptotique des équations linéarisées et des laplaciens mis en jeux dans la section 4 entre des espaces de Sobolev à poids.

Puis, la théorie de Chern–Weil pour la signature et la caractéristique d’Euler de [BiH] nous permet d’en déduire facilement le théorème 1 via une démonstration analogue à celle du cas compact.

Plus généralement, nous démontrons l’existence une solution des équations de Seiberg–Witten dans les cas suivants :

Théorème 2. *Soit M^4 , une variété orientée avec un bord à l'infini Y^3 muni d'une structure CR et d'une 1-forme de contact η compatible avec l'orientation. Soit g une métrique d'Einstein asymptotiquement hyperbolique complexe sur M , c'est à dire vérifiant dans une trivialisation près l'infini*

$$g = dt^2 + \text{sh}^2(2t)\eta^2 + \text{sh}^2(t)\gamma + O(e^{-\delta t}), \quad \delta > 0$$

où $O(e^{-\delta t})$ porte également sur les dérivées successives et $\gamma = d\eta(\cdot, J\cdot)$.

Soit $\mathfrak{s}$ une structure spin^c sur M compatible avec la structure de contact, dont l'invariant de Kronheimer–Mrowka est non nul. Alors, les équations de Seiberg–Witten correspondantes admettent une solution (A, Φ) telle que $A \otimes B^{-1}$, $\Phi - \Phi_0$ et leurs dérivées sont des $O(e^{-(4+\varepsilon)t})$ avec $\varepsilon > 0$ suffisamment petit.

Dans l'énoncé, (B, Φ_0) est la solution standard des équations de Seiberg–Witten pour une métrique formelle de Kähler–Einstein asymptotiquement hyperbolique complexe $\bar{g}$ définie près de l'infini et telle que $g - \bar{g} = O(e^{-4t})$ (cf. section 4).

L'hypothèse que g soit d'Einstein ne sert qu'à obtenir des renseignements supplémentaires sur son comportement asymptotique ; on peut par exemple supposer à la place dans le théorème 2 que g diffère de $\bar{g}$ par un $O(e^{-(4+\varepsilon')t})$ avec $\varepsilon' > 0$.

L'existence de cette solution devrait être justifiée plus naturellement par une théorie de Seiberg–Witten développée directement sur les variétés d'Einstein asymptotiquement hyperboliques complexes.

Par ailleurs, le théorème 2 permet de montrer des rapports intéressants entre la géométrie CR de Y et l'existence de remplissage par des métriques d'Einstein asymptotiquement hyperbolique complexe. En combinant le théorème 2 avec [BiH], Biquard obtient le résultat suivant (cf. section 6) : sous les hypothèses du théorème 2, on a l'inégalité de Miyaoka–Yau

$$(3) \quad 0 \leq \chi(M) - 3\tau(M) + \nu(\partial_\infty M) = \frac{1}{8\pi^2} \int_M \left(3|W_g^-|^2 - |W_g^+|^2 + \frac{s_g^2}{24} \right) \text{vol}^g,$$

où $W_g^\pm$ sont les composantes de la courbure de Weyl et ν est l'invariant de la structure CR à l'infini de M introduit dans [BiH] (où l'identité du membre de droite de (3) est démontrée). De plus on a égalité si et seulement si g est la métrique hyperbolique complexe.

Remerciements

Je remercie chaleureusement Olivier Biquard pour les nombreuses discussions que j'ai eues avec lui sur ce sujet et sur les métriques d'Einstein asymptotiquement hyperboliques complexes.

2. MÉTRIQUE HYPERBOLIQUE COMPLEXE – COLLAGE DE CÔNES

2.1. Le plan hyperbolique complexe. On munit $\mathbb{C}^3$ de la forme hermitienne $\langle z, z \rangle = -\bar{z}_0 z_0 + \bar{z}_1 z_1 + \bar{z}_2 z_2$ et on définit classiquement le plan hyperbolique complexe par $\mathcal{CH}^2 = \mathbb{P}\{z \in \mathbb{C}^3, \langle z, z \rangle < 0\}$. L'espace tangent à $\mathcal{CH}^2$ en un point $z \in \mathbb{C}^3$ est défini par $T_z \mathcal{CH}^2 = z^\perp = \{y \in \mathbb{C}^3, \langle z, y \rangle = 0\}$. Plus généralement on veut pouvoir considérer tout vecteur de $T\mathbb{C}^3$ comme un vecteur tangent à $\mathcal{CH}^2$: pour cela, il suffit de considérer la projection orthogonale de $y \in T_z \mathbb{C}^3$ sur $T_z \mathcal{CH}^2$. On définit alors la métrique hyperbolique complexe sur $\mathcal{CH}^2$ par

$$(4) \quad g_z^{\mathcal{H}}(y, y) = \frac{\langle z, z \rangle \langle y, y \rangle - \langle z, y \rangle \langle y, z \rangle}{-\langle z, z \rangle^2}.$$

Elle est de Kähler-Einstein, sa courbure sectionnelle est comprise entre -1 et -4 et sa forme de Kähler découle d'un potentiel

$$(5) \quad \omega^{\mathcal{H}} = -\frac{i}{2} \partial \bar{\partial} \ln(-\langle z, z \rangle).$$

2.2. Le modèle de la boule. Si on fixe la coordonnée homogène $z_0 = 1$, $\mathbb{CH}^2$ est alors réalisé comme la boule unité

$$B^4 = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2, \rho(z_1, z_2) = \sqrt{|z_1|^2 + |z_2|^2} < 1\} \subset \mathbb{C}^2$$

munie de la métrique de Bergmann

$$(6) \quad g^{\mathcal{H}} = \frac{\text{euc}}{1 - \rho^2} + \frac{\rho^2}{(1 - \rho^2)^2} [(d\rho)^2 + (Jd\rho)^2].$$

On note $\pi : \mathbb{C}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{CP}^1$ la projection canonique ; on a des coordonnées polaires données par

$$\begin{aligned} \mathbb{C}^2 \setminus \{0\} &\xrightarrow{T}]0, +\infty[\times S^3 \\ (z_1, z_2) &\longmapsto (\rho, u), \end{aligned}$$

où $S^3 = \partial B^4 \simeq \partial_{\infty} \mathbb{CH}^2$ est la sphère unité de $\mathbb{C}^2$ et

$$u = \frac{1}{\sqrt{|z_1|^2 + |z_2|^2}} (z_1, z_2).$$

Dans cette nouvelle carte, l'action de $re^{i\theta} \in \mathbb{C}^*$ sur $\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$ est donnée par

$$re^{i\theta} \cdot (\rho, u) = (r\rho, e^{i\theta} \cdot u),$$

où $e^{i\theta} \cdot u$ est l'action de Hopf de S^1 sur S^3 ; on note ∂_r et $\partial_{\theta} = ir\partial_r$ les champs de vecteurs sur $\mathbb{C}^*$ induits par les coordonnées polaires $re^{i\theta}$. Ces champs de vecteurs sont envoyés via l'application tangente en $z = 1$ à l'action de $\mathbb{C}^*$ respectivement sur $\rho\partial_{\rho}$ et $\partial_{\theta} = \rho J\partial_{\rho}$, où par abus de langage ∂_{θ} désigne le champ de vecteurs tangent à l'action de Hopf de S^1 sur S^3 .

On définit la métrique de Fubini-Study sur $\mathbb{CP}^1$, à courbure sectionnelle 4 et de volume π , en coordonnées homogènes par

$$(7) \quad g^{\text{FS}} = \frac{1}{(|z_1|^2 + |z_2|^2)^2} |z_2 dz_1 - z_1 dz_2|^2$$

et sa forme de Kähler est donnée par égale à

$$(8) \quad \omega^{\text{FS}} = \frac{i}{2} \partial \bar{\partial} \ln(\rho^2).$$

On vérifie aisément la formule suivante :

$$(9) \quad g^{\mathcal{H}} = \frac{|d\rho|^2}{(1 - \rho^2)^2} + \left(\frac{2\rho}{1 - \rho^2} \right)^2 \left| \frac{Jd\rho}{2\rho} \right|^2 + \frac{\rho^2}{1 - \rho^2} \pi^* g^{\text{FS}}.$$

Définissons la 1-forme $\eta = -\frac{Jd\rho}{2\rho}$. Il est facile de voir que cette 1-forme est l'image réciproque d'une 1-forme sur S^3 dans les coordonnées polaires, qu'elle est invariante sous l'action de Hopf et que $d\eta = \omega^{\text{FS}}$, où par abus de langage ω^{FS} désigne en fait $\pi^* \omega^{\text{FS}}$.

2.3. Raccordement d'un cône asymptotiquement plat. Plus généralement on s'intéresse aux métriques définies à l'aide d'un couple de fonctions strictement positives $f = (f_1, f_2)$ ne dépendant que de ρ , et données par la formule

$$g_f = f_1(\rho)\text{euc} + f_2(\rho) [|d\rho|^2 + |Jd\rho|^2].$$

On vérifie facilement que g_f est compatible avec la structure complexe. Sa forme de Kähler est donnée par

$$\omega = \rho^2 f_1 \omega^{\text{FS}} + (f_1 + f_2) d(\rho^2) \wedge \eta.$$

On en déduit que g_f est kählérienne relativement à J sous la condition $\rho \partial_\rho f_1 = 2f_2$. Alors, en choisissant une fonction de la forme $f_1(\rho) = C\rho^\alpha$ avec $C, \alpha > 0$, on vérifie via le changement de variable $t^2 = C\rho^{\alpha+2}$ que $\omega = d(t^2\eta)$; on a ainsi défini une métrique de *cône asymptotiquement plat* sur $\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$.

Soit la famille de fonctions $(f_s)_{s \in]0,1[}$ définie par

$$\begin{aligned} f_s(\rho) &= \frac{1}{1-\rho^2} \quad \text{si } \rho < s, \\ f_s(\rho) &= C_s \rho^{\alpha_s} \quad \text{sinon,} \end{aligned}$$

avec des constantes $C_s, \alpha_s > 0$ choisies de telle façon que la fonction f_s soit C^1 par morceaux (on peut également choisir des fonctions C^∞ très proches de cette construction). On note $g_s := g_f$ pour $f = (f_s, \frac{1}{2}\rho\partial_\rho f_s)$. On vient de définir une suite de métriques kählériennes asymptotiquement plates g_s sur $\mathbb{C}^2$, telle que

$$\lim_{s \rightarrow 1} g_s = g^{\mathcal{H}}$$

sur tout compact de B^4 .

2.4. Métriques asymptotiquement hyperboliques complexes. En faisant le changement de variable $t = \arg \text{th } \rho \in]0, +\infty[$, il vient

$$(10) \quad g^{\mathcal{H}} = dt^2 + \text{sh}^2(2t)\eta^2 + \text{sh}^2(t)\pi^*g^{\text{FS}}.$$

De même, les métriques g_s sont de la forme

$$(11) \quad g_s^{\mathcal{H}} = dt^2 + \xi_1^2 \eta^2 + \xi_2^2 \pi^*g^{\text{FS}},$$

où ξ_1 et ξ_2 sont des fonctions de t vérifiant

$$(12) \quad \xi_1 = 2\xi_2 \partial_t \xi_2,$$

et affines pour t assez grand.

Plus généralement, soit M^4 une variété orientée munie d'un bord à l'infini Y^3 doté d'une structure CR et d'une 1-forme de contact η compatible avec l'orientation. On note $\gamma = d\eta(\cdot, J\cdot)$ la métrique de Carnot-Carathéodory sur Y .

On dit qu'une métrique est *asymptotiquement hyperbolique complexe* si il existe une trivialisatation $[0, +\infty[\times Y$ de M près de l'infini telle que

$$g = \hat{g} + O(e^{-\delta t}) \quad \text{avec } \delta > 0 \quad \text{et} \quad \hat{g} = dt^2 + \text{sh}^2(2t)\eta^2 + \text{sh}^2(t)\gamma.$$

Précisons que $O(e^{-\delta t})$ concerne également toutes les dérivées. De façon analogue au cas du plan hyperbolique, on définit une suite de fonctions $(\mu_\tau)_{\tau > 0}$ comme suit : pour $t \leq \tau$ on pose $\mu_\tau(t) = \text{sh } t$ puis on fait un recollement C^2 par morceaux avec la fonction affine $(t - \tau) \text{ch } \tau + \text{sh } \tau$ qu'on approxime par une fonction C^∞ ; nous pourrions nous contenter de la construction singulière en donnant un sens aux dérivées de μ_τ en tant que distributions. Pour régulariser μ_τ , il suffit de faire décroître brutalement $\partial_t^2 \mu_\tau$ de $\text{sh}(\tau - \varepsilon)$ à 0 quitte à rendre $\partial_t^3 \mu_\tau$ très négatif entre $\tau - \varepsilon$ et τ . On en déduit une suite de métriques asymptotiquement plates $\hat{g}_\tau$ par la formule (11), où $\xi_2 = \mu_\tau$ et $\xi_1 = 2\mu_\tau \partial_t \mu_\tau$. Nous choisirons ε ensuite afin que μ_τ soit arbitrairement proche du modèle singulier en norme C^2 .

Puis on étend la structure CR en une structure presque complexe au voisinage de l'infini en posant $J_\tau dt = -\xi_{1,\tau}\eta$. On constate que la métrique hermitienne $(\hat{g}_\tau, J_\tau)$ est presque kählérienne.

Pour étudier les métriques $\hat{g}_\tau$, on utilise le champ de Reeb R défini par $i_R\eta = 1$ et $i_R d\eta = 0$ et on choisit une base locale Y_1, Y_2 de champs de vecteurs sur Y^3 de la distribution de contact $\ker \eta$ avec $Y_2 = JY_1$. On note $x = \xi_1^{-1}R$, $y_i = \xi_2^{-1}Y_i$. Il est facile de voir que

$$[\partial_t, x] = -\frac{\partial_t \xi_1}{\xi_1}x, \quad [\partial_t, y_i] = -\frac{\partial_t \xi_2}{\xi_2}y_i, \quad [x, y_i] = O(\xi_2^{-1}), \quad [y_1, y_2] = O(\xi_2^{-1}),$$

où les termes en $O(\xi_2^{-1})$ portent sur également sur les dérivées. Il en résulte que dans cette trivialisation, le tenseur de Nijenhuis, la connexion de Levi-Civita, la connexion de Chern de $(\hat{g}_\tau, J_\tau)$ et leurs courbures sont égales à celle obtenues en partant de la métrique hyperbolique complexe $g^{\mathcal{H}}$ à un $O(\xi_2^{-1})$ près. On pourra grâce à cette remarque se contenter la plupart du temps de faire des calculs dans ce cas modèle afin d'en déduire des renseignements sur les métriques presque kählériennes $(\hat{g}_\tau, J_\tau)$ et $(\hat{g}, J)$.

On construit maintenant une suite de métriques approximant une métrique asymptotiquement hyperbolique g comme suit : soit $\chi(t)$ une fonction lisse valant 0 pour $t \leq 0$, 1 pour $t \geq \frac{1}{2}$ et strictement croissante entre 0 et $\frac{1}{2}$; on pose

$$(13) \quad \chi_\tau(t) = \chi(t - \tau + 1)$$

puis on définit la suite de métriques

$$(14) \quad g_\tau = \chi_\tau \hat{g}_\tau + (1 - \chi_\tau)g.$$

2.5. Bulle de courbure positive. Si on se contentait d'un recollement C^2 par morceau pour construire la fonction $\xi_{2,\tau}$, la métrique g_τ aurait une singularité dans sa courbure (car on pose $\xi_1 = \partial_t(\xi_2^2)$) ; après avoir régularisé la fonction, ce phénomène se manifeste toujours par une bulle de courbure positive :

Lemme 3. *La courbure F_{B_τ} de la connexion de Chern du fibré anti-canonique associée à la métrique $\hat{g}_\tau$ et la structure presque complexe J_τ se décompose en*

$$(15) \quad F_{B_\tau} = F_\tau^b - i\chi_\tau \frac{\partial_t^2 \xi_1}{\xi_1} dt \wedge \xi_1 \eta,$$

où $|F_\tau^b|$ est uniformément bornée. De plus, on a

$$(16) \quad 2i\Lambda F_{B_\tau} \geq s_{\mathcal{H}} + O(\xi_2^{-t}) \text{ pour } t \leq \tau \text{ et } 2i\Lambda F_{B_\tau} = O(\xi_2^{-1}) \text{ pour } t \geq \tau.$$

On en déduit immédiatement le corollaire suivant dans le cas de $\mathbb{CH}^2$. Si g est une métrique asymptotiquement hyperbolique complexe, la courbure des métriques $\hat{g}_\tau$ diffère de celle calculée dans le cas de $\mathbb{CH}^2$ par un $O(\xi_{2,\tau}^{-1})$ et le corollaire reste valable dans ce cas.

Corollaire 4. *La courbure scalaire des métriques (g_τ) se décompose en*

$$(17) \quad s = s_\tau^b - 2\chi_\tau \frac{\partial^2 \xi_1}{\xi_1},$$

où s_τ^b est bornée indépendamment de τ .

Démonstration du lemme 3: — La métrique et la structure presque complexe du fibré anti-canonique sont explicites près de l'infini ; la connexion de Chern est donc elle-même explicite ainsi que sa courbure et on en déduit le lemme.

Comme nous l'avons remarqué, il suffit d'étudier le cas où $\hat{g}$ est la métrique hyperbolique complexe et on en déduit la courbure de la connexion de Chern à un $O(\xi_{2,\tau}^{-1})$ près. Dans ce

cas, les approximations $\hat{g}_\tau$ sont kähleriennes (cf. 2.3), ce qui simplifie beaucoup les calculs. On commence par choisir une section holomorphe du fibré canonique $\Lambda^{2,0}T\mathbb{C}^2$:

$$\varpi = \frac{\partial}{\partial z_1} \wedge \frac{\partial}{\partial z_2},$$

avec $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$

$$\frac{\partial}{\partial z_1} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_1} - i \frac{\partial}{\partial y_1} \right) \quad \text{et} \quad \frac{\partial}{\partial z_2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_2} - i \frac{\partial}{\partial y_2} \right).$$

Posons

$$u = \bar{z}_2 \frac{\partial}{\partial z_1} - \bar{z}_1 \frac{\partial}{\partial z_2}, \quad v = z_1 \frac{\partial}{\partial z_1} + z_2 \frac{\partial}{\partial z_2}.$$

Puisque

$$\hat{g}_\tau = \frac{f_2}{\rho^4} |\bar{z}_1 dz_1 + \bar{z}_2 dz_2|^2 + \frac{f_1}{\rho^2} |z_2 dz_1 - z_1 dz_2|^2,$$

on en déduit que les vecteurs u et v sont orthogonaux, que

$$|u|^2 = \rho^2 f_1 = \xi_2^2, \quad |v|^2 = f_2 = \frac{1}{4} \xi_1^2$$

et finalement

$$|\varpi| = \frac{1}{\rho^2} |u||v| = \frac{1}{\rho} \sqrt{f_1 f_2} = \frac{\xi_1 \xi_2}{2\rho^2(t)}.$$

Alors

$$\frac{1}{2} F_{B_\tau} = \partial \bar{\partial} \ln |\varpi| = \partial \bar{\partial} \ln \xi_1 + \partial \bar{\partial} \ln \xi_2 - \partial \bar{\partial} \ln \rho^2,$$

or $\partial \bar{\partial} \ln \rho^2 = -2id\eta$. Par ailleurs, on calcule

$$\bar{\partial} \ln \xi_1 = (\partial_t \ln \xi_1) dt^{0,1} = (\partial_t \ln \xi_1) \frac{dt + iJdt}{2} = \frac{1}{2} (\partial_t \ln \xi_1) (dt - i\xi_1 \eta).$$

Puisque $\partial \bar{\partial} = d\bar{\partial}$, il vient

$$\partial \bar{\partial} \ln \xi_1 = -\frac{i}{2} \frac{\partial_t^2 \xi_1}{\xi_1} dt \wedge \xi_1 \eta - \frac{i}{2} \left(\frac{\xi_1}{\xi_2} \partial_t \ln \xi_1 \right) \xi_2 d\eta$$

d'où

$$\partial \bar{\partial} \ln \xi_2 = -\frac{i}{2} (\partial_t^2 \ln \xi_2 + (\partial_t \ln \xi_1)(\partial_t \ln \xi_2)) dt \wedge \xi_1 \eta - \frac{i}{2} \left(\frac{\xi_1}{\xi_2} \partial_t \ln \xi_2 \right) \xi_2 d\eta.$$

En regroupant les termes, on en déduit la formule

$$(18) \quad F_{B_\tau} = - \left[\frac{\partial_t^2 \xi_1}{\xi_1} + \partial_t^2 \ln \xi_2 + (\partial_t \ln \xi_1)(\partial_t \ln \xi_2) \right] i dt \wedge \xi_1 \eta - \left[\frac{\xi_1}{\xi_2} \partial_t \ln(\xi_1 \xi_2) \right] i \xi_2 d\eta.$$

On en déduit le lemme par construction des fonctions ξ_1 et ξ_2 . □

3. ÉQUATIONS DE SEIBERG–WITTEN — ÉNERGIE

Supposons M munie d'une structure $spin^c$ adaptée à la structure de contact notée $\mathfrak{s}$; ceci signifie que près de l'infini, $\mathfrak{s}$ est isomorphe à la structure $spin^c$ standard $\mathfrak{s}_0$ induite par la structure symplectique $\omega^{\hat{g}_\tau}$. En particulier, le fibré de spineurs $W = W^+ \oplus W^-$ est isomorphe près de l'infini à

$$(19) \quad \begin{aligned} W^+ &= \Lambda^{0,0}M \oplus \Lambda^{0,2}M, \\ W^- &= \Lambda^{0,1}M \end{aligned}$$

où $\Lambda^{p,q}M$ est le fibré des formes de type (p, q) par rapport à J_τ . Le *fibré déterminant* de cette structure $spin^c$ est donné près de l'infini par

$$L = K_{J_\tau}^{-1} = \Lambda^2 W^+ = \Lambda^2 W^-.$$

Comme les structures presque complexes J_τ sont homotopes (et même égales pour t suffisamment petit), les fibrés de (p, q) -formes associés sont isomorphes et on omettra généralement de préciser la dépendance en τ . On supposera en outre que la classe de cohomologie près de l'infini $[\omega^{\hat{g}_\tau}]$ se prolonge à l'intérieur de M . Dans le cas où M est le plan complexe cette condition est évidemment vérifiée mais plus généralement, nous avons besoin de faire cette hypothèse pour obtenir appliquer la théorie de Kronheimer–Mrowka (cf. démonstration de la proposition 6).

Soit Φ_0 le champ un spineurs de W^+ défini près de l'infini par $\Phi_0 = (\sqrt{-s_{\mathcal{H}}}, 0)$ et B_τ la connexion de Chern de L associée à la métrique hermitienne déduite de $\hat{g}_\tau$. On a la formule bien connue pour l'opérateur de Dirac défini par $\hat{g}_\tau$ et B_τ

$$D_{B_\tau}^{\hat{g}_\tau}(\alpha, \gamma) = \sqrt{2} \left(\bar{\partial}\alpha + \bar{\partial}^* \gamma \right);$$

en particulier $D_{B_\tau}^{\hat{g}_\tau} \Phi_0 = 0$. La suite de connexions B_τ tend par construction sur tout compact de M vers la connexion de Chern de $\hat{g}$.

Kronheimer et Mrowka développent dans [KM] une théorie de Seiberg–Witten pour des métriques presque kählériennes asymptotiquement plates – ce qui est le cas des métriques g_τ – et des équations de Seiberg–Witten perturbées près de l'infini, de la forme

$$(20) \quad D_A^{g_\tau} \Phi = 0$$

$$(21) \quad F_A^{+g_\tau} - q(\Phi) = F_{B_\tau}^{+g_\tau} - q(\Phi_0),$$

avec Φ un champ de spineurs de W^+ , A une connexion unitaire sur L et $q(\Phi) = \{\Phi^* \otimes \Phi\}_0$ l'endomorphisme hermitien sans trace identifié à la 2-forme autoduale imaginaire pure $F_{A \otimes B_\tau^{-1}}^{+g_\tau}$ via le produit de Clifford.

Kronheimer et Mrowka montrent que l'espace des modules des solutions des équations (A, Φ) modulo l'action du groupe de jauge $\mathcal{G} = \text{Map}(M, S^1)$, donnée par

$$u \cdot (A, \Phi) = \left(A + 2 \frac{du}{u}, u^{-1} \Phi \right),$$

est fini; en comptant algébriquement le nombre de points de l'espace des modules obtient l'invariant de Kronheimer–Mrowka $SW(\mathfrak{s})$, qui ne dépend pas de la métrique g_τ .

En particulier, s'il existe une métrique de Kähler–Einstein asymptotiquement symétrique, sa forme de Kähler définit un remplissage symplectique de M . En notant $\mathfrak{s}_0$ la structure $spin^c$ canonique associée, on a $SW(\mathfrak{s}_0) = 1$ d'après le théorème 1.1 de [KM].

Lorsque l'invariant de Seiberg–Witten est non nul, on obtient donc une suite de solutions des équations de Seiberg–Witten (A_τ, Φ_τ) , pour chaque métrique g_τ telles que

$$(22) \quad A_\tau = B_\tau + a_\tau \quad \text{avec } a_\tau \in L_l^2(g_\tau), \quad \Phi_\tau = \Phi_0 + \varphi_\tau \quad \text{avec } \varphi_\tau \in L_{l, B_\tau}^2(g_\tau),$$

avec l arbitrairement grand. Par ellipticité, on peut supposer que les solutions (A_τ, Φ_τ) sont lisses.

On a l'identité bien connue pour les métriques kählériennes à courbure scalaire constante $F_B^+ = q(\Phi_0)$. On s'attend à ce que cette équation soit vérifiée également par les métriques d'Einstein asymptotiquement hyperboliques complexes, à un terme correctif près à forte décroissance exponentielle. Nous verrons à la section 4 comment modifier la famille de perturbations afin qu'elle s'évanouisse pour les équations limites.

3.1. Contrôle C^0 . En appliquant le principe du maximum on a une première estimée C^0 uniforme a priori sur les spineurs Φ_τ .

Lemme 5. *Il existe une constante c telle que pour toute solution (A, Φ) des équations de Seiberg-Witten, relativement à une métrique g_τ , on ait $|\Phi| < c$ en tout point de M .*

Démonstration. — Puisque $\Phi_\tau - \Phi_0 \in L_l^2$, en choisissant $l \geq 3$, $|\Phi_\tau - \Phi_0|$ tend vers 0 à l'infini sur le cône asymptotiquement plat d'après l'inclusion $L_3^2 \subset C^0$; si $|\Phi_\tau| > |\Phi_0|$ en un point, alors le maximum de $|\Phi|$ est atteint. En un maximum,

$$\begin{aligned} 0 &\leq \frac{1}{2} \Delta |\Phi|^2 = \langle \nabla_{A_\tau}^* \nabla_{A_\tau} \Phi_\tau, \Phi_\tau \rangle - \langle \nabla_{A_\tau} \Phi_\tau, \nabla_{A_\tau} \Phi_\tau \rangle \\ &\leq \langle \nabla_{A_\tau}^* \nabla_{A_\tau} \Phi_\tau, \Phi_\tau \rangle = \langle D_{A_\tau}^2 \Phi_\tau, \Phi_\tau \rangle - \frac{1}{2} \langle F_{A_\tau}^+ \cdot \Phi_\tau, \Phi_\tau \rangle - \frac{s}{4} |\Phi_\tau|^2, \end{aligned}$$

et en utilisant les équations, on en déduit que

$$0 \leq -\frac{1}{4} |\Phi_\tau|^4 - \frac{1}{2} \langle (F_{B_\tau}^+ - q(\Phi_0)) \cdot \Phi_\tau, \Phi_\tau \rangle - \frac{s}{4} |\Phi_\tau|^2.$$

On définit l'opérateur linéaire uniformément borné

$$P_\tau^b = \frac{s_\tau^b}{4} + \frac{1}{2} (F_\tau^b)^+ - \frac{1}{2} q(\Phi_0)$$

et l'opérateur

$$P_\tau = -\chi_\tau \frac{1}{2} \frac{\partial_t^2 \xi_{1,\tau}}{\xi_{1,\tau}} - \chi_\tau \frac{i}{2} \frac{\partial_t^2 \xi_{1,\tau}}{\xi_{1,\tau}} (dt \wedge \xi_{1,\tau} \eta)^+.$$

Puisque $(dt \wedge \xi_{1,\tau} \eta)^+$ agit par multiplication de Clifford avec valeurs propres $\pm i$, on en déduit que P_τ agit avec pour valeurs propres 0 et $-\chi_\tau \xi_{1,\tau}^{-1} \partial_t^2 \xi_{1,\tau}$ et que la partie négative des valeurs propres de $P_\tau + P_\tau^b$ est uniformément minorée. Par le principe du maximum, il en résulte que $|\Phi_\tau|$ est bornée par une constante indépendante de τ . $\square$

Nous précisons maintenant les conventions utilisées dans le cadre presque complexe. La connexion de Chern induite par $\hat{g}_\tau$ sur $W^+ = \Lambda^{0,0} \oplus \Lambda^{0,2}$ est donnée par $\nabla = d \oplus \nabla_B$, où B est la connexion unitaire induite par la métrique sur $K^{-1} = \Lambda^{0,2}$ et ∇_B est la connexion hermitienne associée à B .

Munissons le fibré en droites complexes trivial $\mathbb{C}$ de la connexion $d_a = d + a$, où a est une 1-forme imaginaire pure; on en déduit une connexion hermitienne $d_{\hat{a}} = d + \hat{a} = d + \frac{1}{2}a$ sur $\mathbb{C}^{1/2}$ qui est la racine carrée de d_a . Si on twist le fibré des spineurs W^+ par $\mathbb{C}^{1/2}$, on en déduit une connexion $\nabla_{\hat{a}} = d_{\hat{a}} \oplus (\nabla_B \otimes d_{\hat{a}})$ sur $W^+ \otimes \mathbb{C}^{1/2} = W^+$. On note alors $\bar{\partial}_{\hat{a}} = \nabla_{\hat{a}}^{0,1}$; la connexion $\nabla_{\hat{a}}$ induit une connexion sur $L = \Lambda^2 W^+ = \Lambda^{0,0} \otimes \Lambda^{0,2}$ égale à

$$\nabla_B \otimes d_{\hat{a}} \otimes d_{\hat{a}} = \nabla_B \otimes d_a = \nabla_{B+a};$$

on note alors $A = B + a$ la connexion unitaire correspondante. L'opérateur de Dirac D_A associé à la connexion A et la métrique hermitienne $\hat{g}_\tau$ est donc donné par

$$D_A^{\hat{g}_\tau} \Phi = \sqrt{2} \left(\bar{\partial}_{\hat{a}} \alpha + \bar{\partial}_{\hat{a}}^* \gamma \right),$$

et les équations de Seiberg-Witten s'écrivent (en notant $F_a := da$)

$$(23) \quad \bar{\partial}_a \alpha + \bar{\partial}_a^* \gamma = 0$$

$$(24) \quad \Lambda F_a = \frac{i}{2}(|\alpha|^2 - |\gamma|^2 + s_{\mathcal{H}})$$

$$(25) \quad F_a^{0,2} = \frac{\bar{\alpha}\gamma}{2}.$$

Rappelons les formules de Weitzenböck très utiles (cf. [Ko])

$$(26) \quad \bar{\partial}_a^* \bar{\partial}_a \alpha = \frac{1}{2}(\nabla_a^* \nabla_a \alpha - i\Lambda F_a \alpha),$$

$$(27) \quad \bar{\partial}_a \bar{\partial}_a^* \gamma = \frac{1}{2}(\nabla_a^* \nabla_a \gamma + i\Lambda F_{B+\hat{a}} \gamma).$$

3.2. Énergie. Soit (A, Φ) , où $\Phi = (\alpha, \gamma)$ et $A = B + a$, une configuration à support dans $t > t_0$ telle que $\Phi - \Phi_0$ et a aient une décroissance en $O(e^{-\varepsilon t})$ ainsi que toutes leurs dérivées ; cette hypothèse sert à justifier les intégrations par parties. On calcule alors d'après les formules (26) et (27) en intégrant par rapport à la métrique $\hat{g}_\tau$

$$\begin{aligned} \int |\nabla_{\hat{a}} \alpha|^2 &= \int 2|\bar{\partial}_{\hat{a}} \alpha|^2 + \langle i\Lambda F_{\hat{a}} \alpha, \alpha \rangle = \int 2|\bar{\partial}_{\hat{a}} \alpha|^2 + i\Lambda F_{\hat{a}} |\alpha|^2 \\ \int |\nabla_{\hat{a}} \gamma|^2 &= \int 2|\bar{\partial}_{\hat{a}}^* \gamma|^2 - i\Lambda F_{B+\hat{a}} |\gamma|^2 ; \end{aligned}$$

en additionnant ces identités, il vient

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{2} |\nabla_A \Phi|^2 &= \int \frac{1}{2} (|d_{\hat{a}} \alpha|^2 + |\nabla_{\hat{a}} \gamma|^2) \\ &= \int |\bar{\partial}_{\hat{a}} \alpha|^2 + |\bar{\partial}_{\hat{a}}^* \gamma|^2 + \frac{i}{2} \Lambda F_{\hat{a}} |\alpha|^2 - \frac{i}{2} \Lambda F_{B+\hat{a}} |\gamma|^2 \\ &= \int |\bar{\partial}_{\hat{a}} \alpha + \bar{\partial}_{\hat{a}}^* \gamma|^2 - 2\langle \bar{\partial}_{\hat{a}} \alpha, \bar{\partial}_{\hat{a}}^* \gamma \rangle + \frac{i}{2} (\Lambda F_{\hat{a}} |\alpha|^2 - \Lambda F_{B+\hat{a}} |\gamma|^2) \\ &= \int |\bar{\partial}_{\hat{a}} \alpha + \bar{\partial}_{\hat{a}}^* \gamma|^2 - 2\langle \bar{\partial}_{\hat{a}}^2 \alpha, \gamma \rangle + \frac{i}{2} (\Lambda F_{\hat{a}} |\alpha|^2 - \Lambda F_{B+\hat{a}} |\gamma|^2) \end{aligned}$$

or $\bar{\partial}_{\hat{a}}^2 = F_a^{0,2} + N\partial_{\hat{a}}$ et $2F_{\hat{a}} = F_a$, donc

$$\begin{aligned} \int |\bar{\partial}_{\hat{a}} \alpha + \bar{\partial}_{\hat{a}}^* \gamma|^2 &= \int \frac{1}{2} [|d_{\hat{a}} \alpha|^2 + |\nabla_{\hat{a}} \gamma|^2] \\ &+ \int \frac{i}{2} \Lambda F_B |\gamma|^2 - \frac{i}{4} \Lambda F_a (|\alpha|^2 - |\gamma|^2 + s_{\mathcal{H}}) + \langle F_a^{0,2} \alpha, \gamma \rangle + 2\langle N\partial_a \alpha, \gamma \rangle + s_{\mathcal{H}} \frac{i}{4} \Lambda F_a. \end{aligned}$$

En outre

$$\langle F_a^{0,2} \alpha, \gamma \rangle = \langle F_a^{0,2}, \bar{\alpha}\gamma \rangle = - \left| F_a^{0,2} - \frac{\bar{\alpha}\gamma}{2} \right|^2 + |F_a^{0,2}|^2 + \left| \frac{\bar{\alpha}\gamma}{2} \right|^2$$

et

$$i\Lambda F_a (|\alpha|^2 - |\gamma|^2 + s_{\mathcal{H}}) = \left| i\Lambda F_a + \frac{|\alpha|^2 - |\gamma|^2 + s_{\mathcal{H}}}{2} \right|^2 - |i\Lambda F_a|^2 - \left| \frac{|\alpha|^2 - |\gamma|^2 + s_{\mathcal{H}}}{2} \right|^2.$$

On remarque que

$$(28) \quad \left| \frac{|\alpha|^2 - |\gamma|^2 + s_{\mathcal{H}}}{4} \right|^2 + \left| \frac{\bar{\alpha}\gamma}{2} \right|^2 = \left| \frac{|\alpha|^2 + |\gamma|^2 + s_{\mathcal{H}}}{4} \right|^2 - \frac{s_{\mathcal{H}}}{4} |\gamma|^2$$

et on en déduit l'identité

$$(29) \quad \int |\bar{\partial}_{\hat{a}}\alpha + \bar{\partial}_{\hat{a}}^*\gamma|^2 + \frac{1}{4} \left| i\Lambda F_a + \frac{|\alpha|^2 - |\gamma|^2 + s_{\mathcal{H}}}{2} \right|^2 + \left| F_a^{0,2} - \frac{\bar{\alpha}\gamma}{2} \right|^2 - s_{\mathcal{H}} \frac{i}{4} \Lambda F_a = \\ \int \frac{1}{2} [|d_{\hat{a}}\alpha|^2 + |\nabla_{\hat{a}}\gamma|^2] + \left[\frac{i}{2} \Lambda F_B - \frac{s_{\mathcal{H}}}{4} \right] |\gamma|^2 + \frac{1}{16} (|\alpha|^2 + |\gamma|^2 + s_{\mathcal{H}})^2 \\ + \int 2 \langle N \partial_a \alpha, \gamma \rangle + |F_a^{0,2}|^2 + \frac{1}{4} |i\Lambda F_a|^2.$$

Puisque a et ΛF_a décroissent par hypothèse en $O(e^{-\varepsilon t})$, on en déduit en intégrant par parties que $\int_{t \geq T} \Lambda F_a = \int_{t=T} \frac{i}{4} a \wedge \omega$. Comme par hypothèse ω s'étend en une forme fermée sur la variété M tout entière, on en déduit pour tout $\varepsilon > 0$ une constante C indépendante de τ telle que

$$(30) \quad \left| \int_{t \geq T} s_{\mathcal{H}} \frac{i}{4} \Lambda F_a \text{vol} \right| \leq C + \varepsilon \|da\|_{L^2(\hat{g}_\tau, t < T)}^2.$$

Suivant [KM] on introduit alors une *énergie* «à la Taubes» :

$$(31) \quad E_T^\tau(A, \Phi) = \int_{t \geq T} \left[|\nabla_A(\alpha, \gamma)|^2 + |F_a^+|^2 + |\gamma|^2 + (|\alpha|^2 + |\gamma|^2 + s_{\mathcal{H}})^2 \right] \text{vol}^{g_\tau}$$

où les normes et les connexions sont prises relativement à la métrique g_τ .

Nous allons montrer que l'énergie des solutions des équations de Seiberg–Witten est uniformément bornée dans le cas où g est suffisamment proche de $\hat{g}$ ce qui est automatiquement vrai, à l'action près d'un difféomorphisme, dans le cas d'une métrique d'Einstein asymptotique à la métrique de Bergmann. Dans le cas général d'une métrique d'Einstein asymptotiquement hyperbolique complexe, il faut légèrement modifier la construction des métriques $\hat{g}$ et $\hat{g}_\tau$ afin que l'hypothèse de la proposition 6 suivante continue d'être vérifiée (cf. section 4).

Cette propriété d'énergie bornée est essentielle pour faire converger une suite de solutions pour les métriques g_τ vers une solution des équations de Seiberg–Witten pour la métrique limite g .

Proposition 6. *Supposons que g soit une métrique telle que $g = \hat{g} + O(e^{-\delta t})$ avec $\delta > 2$. Alors, il existe une constante C telle que pour T suffisamment grand, l'énergie des solutions (A_τ, Φ_τ) des équations de Seiberg–Witten (20,21) vérifie $E_T^\tau(A_\tau, \Phi_\tau) \leq C$ pour tout $\tau \geq T$.*

Démonstration. — Soit (A, Ψ) une solution des équations de Seiberg–Witten perturbées pour une des métriques g_τ dans une jauge où $A \otimes B_\tau^{-1}$ et $\Psi - \Phi_0$ décroissent exponentiellement vite (cf. [KM] cor. 3.16). En multipliant Ψ par la fonction de troncature χ_T , on peut appliquer l'identité (29) à $(A, \Phi) = (A, \chi_T \Psi)$; pour κ aussi petit que l'on veut, on sait d'après le lemme 3 que $\frac{i}{2} \Lambda F_{B_\tau} - \frac{s_{\mathcal{H}}}{4} \geq -\kappa$ pour $t \geq T$ suffisamment grand. Par ailleurs, pour $t \geq T$ assez grand, on peut également supposer que $|N| \leq \kappa$. Ainsi, le membre de droite de (29) est un majorant de

$$(32) \quad c \int_{t \geq T} |\nabla_A(\alpha, \gamma)|^2 + |da^+|^2 - \frac{\kappa}{c} |\gamma|^2 + (|\alpha|^2 + |\gamma|^2 + s_{\mathcal{H}})^2 \text{vol}^{\hat{g}_\tau},$$

où $c > 0$ est une constante bien choisie. En utilisant l'identité (29) et l'inégalité (30), on en déduit que (32) est majoré par

$$(33) \quad C + \varepsilon \|da\|^2 + \int_{t \geq T} |\bar{\partial}_{\hat{a}}\alpha + \bar{\partial}_{\hat{a}}^*\gamma|^2 + \frac{1}{4} \left| i\Lambda F_a + \frac{|\alpha|^2 - |\gamma|^2 + s_{\mathcal{H}}}{2} \right|^2 + \left| F_a^{0,2} - \frac{\bar{\alpha}\gamma}{2} \right|^2 \text{vol}^{\hat{g}_\tau}.$$

Par hypothèse $g - \hat{g} = O(e^{-\delta t})$ avec $\delta > 2$ et les connexions spinorielles associées vérifient

$$(34) \quad |\nabla_A^{\hat{g}_\tau} - \nabla_A^{g_\tau}| = O(e^{-\delta t}(1 - \chi_\tau(t))).$$

Comme $e^{-\delta t} \in L^2(g)$, on en déduit en utilisant la borne C^0 sur le spineur que pour des constantes $T, C_2 > 0$ suffisamment grandes, (32) est minoré par

$$(35) \quad \frac{c}{2} \int_{t \geq T} |\nabla_A(\alpha, \gamma)|^2 + |da^+|^2 - \varepsilon |da|^2 - \frac{2\kappa}{c} |\gamma|^2 + (|\alpha|^2 + |\gamma|^2 + s_{\mathcal{H}})^2 \text{vol}^{g_\tau} - C_2,$$

où les normes, la connexion et le projecteur $+$ sont pris par rapport à la métrique g_τ . En appliquant les équations de Seiberg–Witten au terme d^+a avec l'identité (28), il est facile de voir, à condition d'avoir choisi κ suffisamment petit qu'il existe une constante $c' > 0$ telle que (35) soit minoré par

$$(36) \quad c' \int_{t \geq T} |\nabla_A(\alpha, \gamma)|^2 + |da^+|^2 - \frac{c\varepsilon}{c'} |da|^2 + |\gamma|^2 + (|\alpha|^2 + |\gamma|^2 + s_{\mathcal{H}})^2 \text{vol}^{g_\tau} - C_2,$$

En utilisant les équations de Seiberg–Witten, la propriété (34) et la borne C^0 sur le spineur on en déduit que l'expression (33) est majorée par

$$C + C_2 + 2\varepsilon \|da\|_{L^2(g_\tau, M)}^2 = C + C_2 + 4\varepsilon \|da^{+g_\tau}\|_{L^2(g_\tau, M)}^2,$$

quitte à choisir T suffisamment grand ; c'est donc également un majorant de (36). Nous insistons sur le fait que c et c' ne dépendent pas du choix de ε .

En résumé, nous avons montré que pour tout $\varepsilon' > 0$, il existe des constantes $T, C' > 0$, telles que

$$C + \varepsilon \|da_\tau^{+g_\tau}\|_{L^2(g_\tau, M)}^2 \geq E_T^\tau(A_\tau, \Phi_\tau).$$

En découpant

$$\varepsilon' \|da_\tau^{+g_\tau}\|_{L^2(g_\tau, M)}^2 = \varepsilon' \|da_\tau^{+g_\tau}\|_{L^2(g_\tau, t < T)}^2 + \varepsilon' \|da_\tau^{+g_\tau}\|_{L^2(g_\tau, t > T)}^2$$

on remarque que le premier terme est borné à l'aide de la borne uniforme C^0 sur le spineur, et que le deuxième terme est contrôlé par l'énergie en choisissant ε' suffisamment petit. On en déduit la proposition. $\square$

3.3. Première valeur propre du laplacien. La courbure moyenne est un outil essentiel pour analyser des différents laplaciens que nous rencontrerons par la suite.

Soit un produit riemannien tordu $[t_1, t_2] \times Y$ muni d'une métrique, $g = dt^2 + g_t$, où g_t est une famille de métriques sur Y . On définit la courbure moyenne des sphères $S_t = \{t\} \times Y$ de rayon t par

$$H = \frac{1}{3} \text{tr}_g \mathbb{I} = -\frac{1}{3} \frac{\partial_t \text{vol}^{g_t}}{\text{vol}^{g_t}},$$

où $\mathbb{I}$ désigne la deuxième forme fondamentale de S_t et vol^{g_t} est la forme volume associée à g_t . Par commodité, on définit également une courbure moyenne normalisée $h = \frac{3}{2}H$. On a alors le lemme très utile suivant :

Lemme 7. *Soit $g = dt^2 + g_t$ une métrique riemannienne sur $[t_1, t_2] \times Y$ et $\delta \in \mathbb{R}$. Supposons qu'il existe $h_0 \in \mathbb{R}$ tel que $0 > h_0 \geq h$. Alors pour toute fonction f , on a*

$$(37) \quad \int_{[t_1, t_2] \times N} |\partial_t f|^2 \text{vol}^g \geq h_0^2 \int_{[t_1, t_2] \times N} |f|^2 \text{vol}^{g_t} + h_0 \left[\int_{t=t_2} |f|^2 \text{vol}^{g_t} - \int_{t=t_1} |f|^2 \text{vol}^{g_t} \right].$$

En particulier la métrique asymptotiquement hyperbolique $\hat{g}$ vérifie $\text{vol}^{\hat{g}} = \text{sh}^2 t \, \text{sh}(2t) dt \wedge \eta \wedge d\eta$ d'où $h \rightarrow -2$; on peut lui appliquer le lemme précédent. En revanche, pour une métrique $\hat{g}_\tau$, la courbure moyenne tend vers 0 près de l'infini sur le cône asymptotiquement plat. Néanmoins on a le contrôle suivant :

Lemme 8. *Pour toute fonction f à support compact définie sur $M \cap \{t \geq \tau\}$, on a*

$$(38) \quad \int_{t>\tau} |\partial_t f|^2 \text{vol}^{\hat{g}_\tau} - (\text{th } \tau)^{-2} \int_\tau |f|^2 \text{vol}^{\hat{g}_{\tau,t}} \geq \int_{t>\tau} \left| \frac{\text{ch } \tau}{\xi_2} f \right|^2 \text{vol}^{\hat{g}_\tau}.$$

les normes étant prises par rapport à la métrique $\hat{g}_\tau$.

Démonstration. — On fait les changements de variables $\xi_2 = \text{ch } \tau(t - \tau) + \text{sh } \tau$ puis $r = \ln \xi_2$. Alors $\frac{d\xi_2}{\xi_2} = dr$, $d\xi_2 = \text{ch } \tau dt$ et la forme volume de $\hat{g}_\tau$ s'écrit $2\xi_2^3 d\xi_2 \wedge \eta \wedge d\eta$; on en déduit l'identité

$$\int_{t>\tau} |\partial_t f|^2 \text{vol}^{\hat{g}_\tau} = \int 2 \text{ch}^2 \tau |\partial_{\xi_2} f|^2 \xi_2^3 d\xi_2 \wedge \eta \wedge d\eta = \int 2 \text{ch}^2 \tau |\partial_r f|^2 e^{2r} dr \wedge \eta \wedge d\eta.$$

En appliquant le lemme 7 avec $h_0 = -1$, le terme de bord sur t_2 est nul près de l'infini car f est supposée à support compact, puis en faisant le changement de variable inverse, on obtient

$$(39) \quad \int_{t>\tau} |\partial_t f|^2 \text{vol}^{\hat{g}_\tau} \geq \int_{t>\tau} \left| \frac{\text{ch } \tau}{\xi_2} f \right|^2 \text{vol}^{\hat{g}} + (\text{th } \tau)^{-2} \int_{t=\tau} |f|^2 \text{vol}^{\hat{g}_{\tau,t}}$$

d'où le résultat. $\square$

On introduire naturellement un nouvel espace de Sobolev : pour toute fonction f sur M , on pose

$$(40) \quad \|f\|_\tau = \|f\|_{L^2(g_\tau, t < \tau)} + \left\| \frac{\text{ch } \tau}{\xi_2} f \right\|_{L^2(g_\tau, t > \tau)}.$$

Lemme 9. *Il existe une constante $c > 0$ et T suffisamment grand tels que pour toute fonction f à support compact définie sur $Z_T = M \cap \{t \geq T\}$ nulle en $t = \tau$ et pour toute métrique g_τ avec $\tau > T$ on ait*

$$(41) \quad \|\partial_t f\|_{L^2(g_\tau, Z_T)}^2 \geq c \|f\|_{\tau, Z_T}^2;$$

ce lemme est également vérifié par les métriques $\hat{g}_\tau$.

Démonstration. — On commence par démontrer le lemme pour les métriques $\hat{g}_\tau$, puis on en déduit automatiquement le résultat pour les métriques g_τ . Il suffit de constater que les intégrants sont perturbés lorsqu'on passe de la métrique $\hat{g}_\tau$ à la métrique g_τ par un terme de la forme $(1 - \chi_\tau(t))\varepsilon(t)(|f|^2 + |df|^2)$, où χ_τ est la fonction de troncature définie au (13) et $\varepsilon(t)$ une fonction indépendante de τ tendant vers 0. Ce terme provient du recollement entre g et $\hat{g}$ pour $t < \tau$ et $\varepsilon(t) \rightarrow 0$ tient compte du fait que g est asymptotique à $\hat{g}$.

Mais ce résultat est évident pour les métriques $\hat{g}_\tau$: on choisit une constante $0 < c \leq 1$, on minore

$$\int_{[T, +\infty]} |\partial_t f|^2 \text{vol} \geq \int_{[T, \tau]} |\partial_t f|^2 \text{vol} + c \int_{[T, +\infty]} |\partial_t f|^2 \text{vol},$$

et on ajuste c de sorte qu'après avoir appliqué les lemmes 7 et 8 il ne reste plus qu'une intégrale de bord positive en $t = \tau$ dans le membre de droite de l'inégalité. $\square$

On en déduit classiquement une inégalité de Poincaré sur M .

Corollaire 10 (Inégalité de Poincaré). *Il existe une constante $c > 0$ telle que pour toute fonction f sur M telle que $\|f\|_\tau < \infty$, on ait*

$$\|df\|_{L^2(g_\tau)} \geq c \|f\|_\tau.$$

Démonstration. — Supposons l'assertion fautive. On en déduit une suite de fonctions f_τ telles que $\|df\|_{L^2(g_\tau)} \rightarrow 0$ et $\|f\|_\tau = 1$. Alors, quitte à extraire, cette suite admet une limite faible sur tout compact $f \in L_1^2(g)$. A la limite $df = 0$ donc f est constante. Comme la métrique est de volume infini et f est L^2 , nécessairement $f = 0$. Par compacité de l'inclusion $L^2 \subset L_1^2$, la suite f_τ converge en fait vers 0 au sens L^2 -fort sur tout compact de M .

Choisissons T suffisamment grand afin d'appliquer le lemme 11 ; on majore

$$\begin{aligned} 1 &= \|f_\tau\|_\tau^2 = 2\|(1 - \chi_T)f_\tau\|^2 + 2\|\chi_T f_\tau\|_\tau^2 \\ &\leq 2\|(1 - \chi_T)f_\tau\|^2 + 2c^{-1} \int |d(\chi_T f_\tau)|^2 \text{vol} \\ &\leq 2\|(1 - \chi_T)f_\tau\|^2 + 4c^{-1} \int |(\partial_t \chi_T)f_\tau|^2 \text{vol} + 2c^{-1} \int |\chi_T df_\tau|^2 \text{vol}, \end{aligned}$$

mais le membre de droite tend vers 0 lorsque τ tend vers l'infini d'où une contradiction. Le corollaire est par conséquent vérifié. $\square$

3.4. Laplacien des 1-formes. Calculons le laplacien des 1-formes pour une métrique $g = dt + \xi_1^2 \eta^2 + \xi_2^2 \gamma$, telle que $\xi_1 = 2\xi_2 \xi_2'$. Une 1-forme a se décompose en

$$a = f dt + q \xi_1 \eta + b,$$

où f et q sont des fonctions et b une 1-forme tangente à la distribution de contact, c'est à dire telle que $i_{\partial_t} b = i_{\mathcal{X}} b = 0$. Un calcul direct de $\Delta a = (dd^* + d^*d)a$, en utilisant la formule $\partial_t b = \nabla_{\partial_t} b - \mathbb{I}(b)$, montre que

$$\begin{aligned} \Delta a &= \left(-\partial_t^2 f + 2h\partial_t f + 2h'f + \Delta f - x^2 \cdot f + \frac{\xi_1'}{\xi_1} x \cdot q + [\partial_t, d^*]b \right) dt \\ &\quad + \left(-\partial_t^2 q + 2h\partial_t q + 2h'q + \Delta q - x^2 \cdot q - \frac{\xi_1'}{\xi_1} x \cdot f + [x, d^*]b - 2\frac{\xi_2'}{\xi_2} *db \right) \xi_1 \eta \\ &\quad - \nabla_{\partial_t}^2 b + 2h\nabla_{\partial_t} b - \frac{(\xi_2')^2 + 2\xi_2 \xi_2''}{\xi_2^2} b + 2\Delta b + *x * x \cdot b - 2\frac{\xi_2'}{\xi_2} (df - *dg), \end{aligned}$$

où $x = \xi_1^{-1}R$, avec R le champ de Reeb, et les opérateurs $d, *, d^*, \Delta$ apparaissant dans le membre de droite sont définis le long de la distribution de contact. Plus précisément, db représente la projection orthogonale de la différentielle de b sur la distribution de contact ; $*$ est l'opérateur de Hodge défini sur la distribution de contact par $b \wedge *b = \xi_2^2 d\eta$; on en déduit une divergence d^* et un laplacien Δ formés à l'aide de ces deux opérateurs.

En intégrant par parties pour t fixé et en utilisant le fait que la forme volume est invariante suivant x , on obtient

$$\begin{aligned} (42) \quad \int_t \langle \Delta a, a \rangle \text{vol}^{g_t} &= \int_t \left(\langle -\partial_t^2 f + 2h\partial_t f, f \rangle + |x \cdot f|^2 + \langle \frac{\xi_1'}{\xi_1} x \cdot q, f \rangle + |df|^2 + 2h'|f|^2 \right. \\ &\quad + \langle -\partial_t^2 q + 2h\partial_t q, q \rangle + |x \cdot q|^2 - \langle \frac{\xi_1'}{\xi_1} x \cdot f, q \rangle + |dq|^2 + 2h'|q|^2 \\ &\quad \left. + \langle -\nabla_{\partial_t}^2 b + 2h\nabla_{\partial_t} b - \frac{(\xi_2')^2 + 2\xi_2 \xi_2''}{\xi_2^2} b, b \rangle + |x \cdot b|^2 + |db|^2 + |d^*b|^2 \right) \text{vol}^{g_t}. \end{aligned}$$

En intégrant maintenant par parties suivant t , on obtient

$$\begin{aligned} & \int_{[t_1, t_2]} \langle \Delta a, a \rangle \text{vol}^g + \int_{\partial[t_1, t_2]} \langle \nabla_{\partial_t} a, a \rangle \text{vol}^{g_t} \\ &= \int_{[t_1, t_2]} \left(|\partial_t f|^2 + |x \cdot f|^2 + \left\langle \frac{\xi'_1}{\xi_1} x \cdot q, f \right\rangle + |df|^2 + 2h'|f|^2 \right. \\ & \quad + |\partial_t q|^2 + |x \cdot q|^2 - \left\langle \frac{\xi'_1}{\xi_1} x \cdot f, g \right\rangle + |dq|^2 + 2h'|q|^2 \\ & \quad \left. + |\nabla_{\partial_t} b|^2 - \frac{(\xi'_2)^2 + 2\xi_2 \xi_2''}{\xi_2^2} |b|^2 + |x \cdot b|^2 + |db|^2 + |d^* b|^2 \right) \text{vol}^g. \end{aligned}$$

Par la formule de Bochner $\Delta a = \nabla^* \nabla a + \text{Ric}(a)$, on reconnaît que le terme de gauche de l'identité ci-dessus est égal à $\int_{[t_1, t_2]} (|\nabla a|^2 + \text{Ric}(a, a)) \text{vol}^g$.

Par construction, la courbure moyenne des métriques $\hat{g}_\tau$ est croissante, soit $h' \geq 0$. En minorant,

$$\left\langle \frac{\xi'_1}{\xi_1} x \cdot q, f \right\rangle + |x \cdot f|^2 - \left\langle \frac{\xi'_1}{\xi_1} x \cdot f, q \right\rangle + |x \cdot q|^2 \geq -\left| \frac{\xi'_1}{2\xi_1} f \right|^2 - \left| \frac{\xi'_1}{2\xi_1} q \right|^2,$$

on en déduit l'inégalité

$$(43) \quad \int_{[t_1, t_2]} (|\nabla a|^2 + \text{Ric}(a, a)) \text{vol}^g \geq \int_{[t_1, t_2]} \left(|\partial_t f|^2 - \left| \frac{\xi'_1}{2\xi_1} f \right|^2 + |\partial_t q|^2 - \left| \frac{\xi'_1}{2\xi_1} q \right|^2 + |\nabla_{\partial_t} b|^2 - \frac{(\xi'_2)^2 + 2\xi_2 \xi_2''}{\xi_2^2} |b|^2 \right) \text{vol}^g.$$

Ce calcul nous permet de démontrer le lemme suivant.

Lemme 11. *Il existe des constantes $c, T > 0$ telles que pour toute métrique g_τ et toute 1-forme $a \in L_1^2(g_\tau)$ définie sur le bout $[T, +\infty[\times Y$ on ait*

$$\int_{t>T} (|\nabla a|^2 + \text{Ric}^{g_\tau}(a, a)) \text{vol} \geq c \int_{[T, \tau]} |a|^2 \text{vol},$$

les normes étant prises par rapport à la métrique g_τ . Ce lemme est également valable pour les métriques $\hat{g}_\tau$.

Démonstration. — On commence par démontrer le lemme pour les métriques $\hat{g}_\tau$, puis on en déduit automatiquement le résultat pour les métriques g_τ . Il suffit de constater que les intégrants sont perturbés lorsqu'on passe de la métrique $\hat{g}_\tau$ à la métrique g_τ par un terme de la forme $(1 - \chi_\tau(t))\varepsilon(t)(|a|^2 + |\nabla a|^2)$, où χ_τ est la fonction de troncature définie au (13) et $\varepsilon(t)$ une fonction indépendante de τ tendant vers 0.

Examinons les termes d'ordre 0 dans le membre de droite de l'inégalité (43). Sur l'intervalle $[T, \tau]$, on a par construction

$$\frac{\xi'_1}{2\xi_1} \leq 1, \quad \frac{(\xi'_2)^2 + 2\xi_2 \xi_2''}{\xi_2^2} \leq 3;$$

sur la partie conique $[\tau, +\infty]$, on a

$$\frac{\xi'_1}{2\xi_1} = \frac{\text{ch } \tau}{2\xi_2}, \quad \frac{(\xi'_2)^2 + 2\xi_2 \xi_2''}{\xi_2^2} = \left(\frac{\text{ch } \tau}{\xi_2} \right)^2.$$

On utilise le lemme 7 avec h_0 proche de -2 sur l'intervalle $[T, \tau]$ et le lemme 8 sur l'intervalle $[\tau, +\infty]$. On en déduit, en négligeant le terme de bord en T qui est positif, une constante

$c > 0$ telle que

$$\int_{[T,\tau]} (|\nabla a|^2 + \text{Ric}^{g_\tau}(a, a)) \text{vol} \geq c \int_{[T,\tau]} |a|^2 \text{vol} + h_0 \int_\tau |a|^2 \text{vol}^{g_t},$$

et

$$\int_{[\tau, +\infty]} (|\nabla a|^2 + \text{Ric}^{g_\tau}(a, a)) \text{vol} \geq (\text{th } \tau)^{-2} \int_\tau |a|^2 \text{vol}^{g_t}.$$

On peut ajuster une constante $0 < c' \leq 1$ telle que $c'h_0 + (\text{th } \tau)^{-2} > 0$ pour tout τ suffisamment grand. Alors

$$\begin{aligned} \int_{[T, +\infty]} (|\nabla a|^2 + \text{Ric}^{g_\tau}(a, a)) \text{vol} &\geq c' \int_{[T,\tau]} (|\nabla a|^2 + \text{Ric}^{g_\tau}(a, a)) \text{vol} \\ &\quad + \int_{[\tau, +\infty]} (|\nabla a|^2 + \text{Ric}^{g_\tau}(a, a)) \text{vol}, \end{aligned}$$

et le terme de bord en τ , apparaissant dans le membre de droite après minoration est positif ; on obtient ainsi l'inégalité souhaitée. $\square$

3.5. Convergence des solutions sur tout compact. Nous avons maintenant tous les outils nécessaires pour faire converger la suite de solution des équations de Seiberg–Witten (A_τ, Φ_τ) sur tout compact de M . Nous supposons dans la fin de cette section que l'énergie des solutions (A_τ, Φ_τ) admet une borne uniforme. Nous voulons faire converger cette suite quitte à faire des changements de jauge et à extraire une sous-suite vers une solutions des équations pour la métrique g

$$(44) \quad \begin{aligned} D_A^g \Phi &= 0 \\ F_{A \otimes B^{-1}}^{+g} &= q(\Phi) - q(\Phi_0), \end{aligned}$$

où B est la connexion de Chern de la métrique $\hat{g}$.

Dans un premier temps nous faisons converger les solutions hors d'un compact suffisamment grand. On commence par fixer une jauge de Hodge en faisant agir le groupe de jauge $\mathcal{G} = \text{Map}(M, S^1)$.

Lemme 12. *Quitte à faire des changements de jauge, on peut supposer que $d^*a_\tau = 0$ et $a_\tau \in L^2(g_\tau)$ sur M .*

Démonstration. — On cherche une fonction u telle que $d^*a_\tau + d^*du = 0$. Il est possible de résoudre le problème en minimisant la fonctionnelle

$$\int_M \left(\frac{1}{2} |du|^2 + \langle a_\tau, du \rangle \right) \text{vol}^{g_\tau}$$

et on obtient une solution telle que

$$\int |du|^2 \text{vol} = -2 \int \langle a, du \rangle \leq 2 \|du\|_{L^2(g_\tau)} \|a\|_{L^2(g_\tau)},$$

d'où $du \in L^2(g_\tau)$. En fait, on en sait un peu plus sur u car d'après le corollaire 10

$$\|du\|_{L^2(g_\tau)} \geq c \|u\|_\tau$$

pour toute fonction à support compact et l'inégalité reste vraie par passage à la limite. Par conséquent, u admet une borne L_1^2 sur chaque compact et par régularité elliptique locale, on en déduit que u est une fonction lisse. Finalement, la transformation de jauge $e^{u/2}$ résout le problème. $\square$

Notons qu'on perd a priori de la régularité sur Φ_τ en se plaçant en jauge de Hodge, mais l'énergie bornée offre un contrôle suffisant pour faire converger les solutions. La borne C^0 a

priori sur le spineur et l'énergie fournissent une borne uniforme sur $\|d^+a_\tau\|_{L^2(g_\tau)}$. En intégrant par parties et en utilisant le fait que nous sommes dans une jauge de Hodge, on en déduit une borne uniforme sur $\int_M |\nabla a_\tau|^2 + \text{Ric}(a_\tau, a_\tau) \text{vol}$. Puis en utilisant le lemme 11, on en déduit une borne uniforme sur $\int_{[T, \tau]} |a|^2 \text{vol}$ pour T suffisamment grand. On en déduit quitte à extraire une sous-suite que a_τ converge sur tout compact vers une limite faible $a \in L_1^2(g)$.

La borne C^0 sur le spineur Φ_τ et la borne sur $\int_{t>T} |\nabla \Phi_\tau|^2 \text{vol}$ fournie par l'énergie nous indiquent que Φ_τ est borné en norme L_1^2 sur un compact fixé. Par extraction diagonale, on en déduit que Φ_τ converge sur tout compact de M vers une limite faible Φ . On obtient ainsi une limite (A, Φ) , où $A = B + a$, solution des équations de (44) et d'énergie finie, définie sur le bout $t > T$. Par ellipticité du problème (A, Φ) est en fait lisse. L'énergie nous permet maintenant de récupérer un contrôle global sur (A, Φ) .

Lemme 13. *Soit (A, Φ) une solution d'énergie finie des équations de Seiberg–Witten (44) pour la métrique g telle que $A \otimes B^{-1} \in L_1^2(g)$ et Φ borné en norme C^0 . Alors quitte à faire un changement de jauge par une constante $u \in S^1$ on a $\Phi - \Phi_0 \in L_1^2$.*

On peut donc faire converger les solutions (A_τ, Φ_τ) sur le bout de M . On se place en jauge de Hodge à l'aide du lemme 12 et on peut extraire une limite sur tout compact (A, Φ) d'énergie finie. Puis du lemme 13 on déduit :

Corollaire 14. *Supposons l'énergie des solutions (A_τ, Φ_τ) uniformément bornée. Alors pour T suffisamment grand, quitte à faire des changements de jauge et à extraire une sous-suite, on en déduit que (A_τ, Φ_τ) converge sur tout compact de $M \cap \{t \geq T\}$ vers une solution (A, Φ) des équations de Seiberg–Witten (44), relatives à la métrique asymptotiquement hyperbolique complexe g , telle que $A \otimes B^{-1}$ et $\Phi - \Phi_0$ sont dans $L_1^2(g)$.*

Remarque : au départ nous avons défini des métriques g_τ pour une famille d'indices $\tau \in \mathbb{R}^+$. Dans le corollaire ci-dessus et dans toute la suite de cet article, une *suite extraite* de $(v_\tau)_{\tau \in \mathbb{R}^+}$ désignera une sous-suite $(v_\tau)_{\tau \in I}$, où $I \subset \mathbb{R}^+$ est un ensemble infini et non borné.

Démonstration du lemme 13 : — L'énergie finie nous permet de conclure instantanément que $\gamma \in L_1^2(g)$ en décomposant $\Phi = (\alpha, \gamma)$. Quant à α , on sait seulement que $\int_{t>T} |\nabla_{\hat{a}} \alpha|^2 \text{vol} < +\infty$. En identifiant par transport parallèle les spineurs sur le bout de M à des familles de spineurs sur Y dépendant de t , on peut écrire

$$\Phi(t_2, y) - \Phi(t_1, y) = \int_{t_1}^{t_2} (\nabla_{\partial_t}^A \Phi) dt.$$

On en déduit que

$$|\Phi(t_2, y) - \Phi(t_1, y)|^2 \leq \frac{e^{-4t}}{4} \int_{t_1}^{t_2} |\nabla_{\partial_t}^A \Phi|^2 e^{4t} dt.$$

Comme $|\nabla^A \Phi|^2$ est intégrable, on en déduit que $\Phi(t, y)$ est de Cauchy pour presque tout y . On obtient une limite $\Phi(y)$ telle que

$$(45) \quad \int_{\{t_1\} \times Y} |\Phi(t, y) - \Phi(y)|^2 \text{vol}^g \leq c \int_{[t_1, +\infty] \times Y} |\nabla_{\partial_t}^A \Phi|^2 \text{vol}^g.$$

Évidemment par construction $\nabla_{\partial_t}^A \Phi(y) = 0$, et via le lemme 7 on obtient

$$\int_{[T, t_1]} |\nabla_{\partial_t}^A \Phi| \text{vol}^g \geq h_0^2 \int_{T, t_1} |\Phi - \Phi(y)|^2 \text{vol}^g + h_0 \int_{\partial[T, t_1]} |\Phi - \Phi(y)|^2 \text{vol}^{g_t};$$

D'après (45) l'intégrale de bord en t_1 tend vers 0 lorsque t_1 tend vers l'infini. On en déduit que $\Phi - \Phi(y) \in L^2(g)$.

Fixons un point $y \in Y$. Puisque la métrique est asymptotiquement hyperbolique complexe, on a une suite d'ouverts $V_y(t)$, qui s'identifient à la boule unité centrée en 0 de $\mathbb{CH}^2$ via une isométrie, sur lesquels la métrique g tend vers la métrique hyperbolique complexe lorsque t tend vers l'infini cf. ([Bi] section I.1.B). En transportant également la solution (A, Φ) des équations de Seiberg–Witten sur $V_y(t)$, on en déduit une suite de solution (A_t, Φ_t) sur la boule unité de $\mathbb{CH}^2$ centrée en 0. Puisque (A, Φ) était d'énergie finie, l'énergie de (A_t, Φ_t) tend vers 0 sur la boule. Comme par hypothèse $A \otimes B^{-1} \in L_1^2(g)$, on en déduit que $A_t \otimes A_0^{-1}$, où A_0 est la connexion de Chern du fibré anti-canonique de $\mathbb{CH}^2$, tend vers 0 en norme L_1^2 , relativement à la métrique hyperbolique complexe, lorsque t tend vers l'infini. Puisque l'énergie de (A_t, Φ_t) est bornée et que Φ_t est uniformément borné en norme C^0 , on obtient une borne uniforme sur la norme L_1^2 de Φ_t sur la boule unité de $\mathbb{CH}^2$. On peut donc en extraire une limite faible Ψ . À la limite, (A_0, Ψ) est une solution d'énergie nulle des équations de Seiberg–Witten pour la métrique hyperbolique complexe. On en déduit que Ψ est parallèle et finalement que $\Psi = (u\sqrt{-s_{\mathcal{H}}}, 0)$ où $u \in S^1$ est constante. Par compacité de l'inclusion $L^2 \subset L_1^2$, Φ_t converge en fait vers Ψ au sens L^2 -fort sur la boule. Par conséquent en ramenant $\Phi(y)$ sur la boule unité, on a $\Psi = \Phi(y) = (u\sqrt{-s_{\mathcal{H}}}, 0)$. En faisant agir la transformations de jauge constante u^{-1} sur (A, Φ) , on en déduit le lemme. $\square$

En ce qui concerne le domaine compact $M \cap \{t \leq T + 1\}$, la borne uniforme C^0 sur le spineur suffit pour faire converger la suite de solution (A_τ, Φ_τ) . Nous nous référons par exemple au lemme 4 de [KM2] afin d'énoncer le résultat suivant :

Lemme 15. *Soit une variété à bord $\overline{X}$ munie d'une structure spin^c et d'une métrique riemannienne g . Soit (A_τ, Φ_τ) une suite de solutions des équations de Seiberg–Witten telle qu'il existe $C > 0$ avec $|\Phi_\tau| \leq C$ pour tout τ . Quitte à faire des changements de jauge et à extraire une sous-suite, la suite (A_τ, Φ_τ) converge au sens C^∞ sur $\overline{X}$ vers une solutions (A, Φ) des équations de Seiberg–Witten (44).*

Remarque : c'est la même démonstration que dans le cas compact. Il faut faire attention pour faire converger la connexion : sur les variétés à bord, on dispose d'une théorie de Hodge en fixant une condition de Neumann convenable pour les formes harmoniques. Cette condition se traduit sur les 1-formes par l'annulation suivant la normale au bord.

On peut également supposer que la métrique dépend de τ dans le lemme 15 et converge au sens C^∞ vers une métrique g sur $\overline{X}$.

Notre problème est maintenant de «recoller» les solutions obtenues sur les domaines $t \leq T + 1$ et $t \geq T$ de M . Nous avons besoin du lemme préliminaire suivant :

Lemme 16. *Soit (A, Φ) une solutions d'énergie finie des équations de Seiberg–Witten (44) pour la métrique g , définie près de l'infini. Alors il existe $\varepsilon > 0$, et T suffisamment grand tels que sur le domaine $M \cap \{t \geq T\}$ on ait $|\alpha| > \varepsilon$, en décomposant $\Phi = (\alpha, \gamma)$.*

Démonstration. — Supposons le lemme faux. Alors, il existe une suite de points $z_j \in M$ tendant vers le bord à l'infini tels que $|\alpha|(z_j) \rightarrow 0$. En faisant la même construction que dans la démonstration du lemme 13, on obtient une suite de (A_j, Φ_j) en ramenant z_j en 0 par une isométrie de $\mathbb{CH}^2$ dont l'énergie tend vers 0 sur la boule unité. Quitte à faire des transformations de jauge, cette suite converge vers une solutions d'énergie nulle des équations de Seiberg–Witten sur $\mathbb{CH}^2$. Par régularité elliptique, la convergence est en réalité C^∞ et donc à la limite $\alpha(0) = 0$; ceci contredit l'énergie nulle. $\square$

En appliquant le lemme 14 on fait converger la suite (A_τ, Φ_τ) vers (A, Φ) sur le bout $t \geq T$ pour T suffisamment grand en extrayant et en faisant des transformations de jauge sur M . Puis en appliquant le lemme 14, on trouve une suite de transformations de jauge u_τ telles que, quitte à extraire, $u_\tau \cdot (A_\tau, \Phi_\tau)$ converge sur $M \setminus \{t > T + 1\}$. En décomposant

$\Phi_\tau = (\alpha_\tau, \gamma_\tau)$ et en utilisant le fait que les convergences sont C^∞ sur tout compact, on en déduit d'après le lemme 16 un $\varepsilon > 0$ tel que pour τ suffisamment grand, $|\alpha_\tau| > \varepsilon$ pour tout $t \geq T$. On en déduit que u_τ converge également sur l'anneau $[T, T+1]$. Alors pour N et τ suffisamment grand, on peut écrire $u_\tau = e^{iv_\tau} u_N$ pour un unique v_τ tel que $|v_\tau| < \pi/2$. On définit les transformations de jauge f_τ par : $f_\tau = u_\tau u_N^{-1}$ pour $t \leq T$, $f_\tau = \exp(i(1 - \chi_{T+1})v_\tau)$ pour $t \geq T$ (cf. (13) pour la définition de χ). Alors $f_\tau \cdot (A_\tau, \Phi_\tau)$ converge sur M tout entier et on peut énoncer le résultat suivant :

Proposition 17. *Soit g une métrique asymptotiquement hyperbolique complexe sur M , munie d'une structure spin^c adaptée. Soit (A_τ, Φ_τ) une suite de solutions d'énergie bornée des équations de Seiberg–Witten perturbées relatives aux métriques asymptotiquement plates g_τ approximant g . Alors quitte à faire des changements de jauge et à extraire une sous-suite, (A_τ, Φ_τ) converge sur tout compact de M vers une solution (A, Φ) des équations de Seiberg–Witten (44) pour la métrique g telle que $\Phi - \Phi_0 \in L_1^2$, $a = A \otimes B^{-1} \in L_1^2$ et $d^*a = 0$ près de l'infini.*

4. MÉTRIQUES D'EINSTEIN ASYMPTOTIQUEMENT HYPERBOLIQUES COMPLEXES

On suppose maintenant dans toute cette section que g est une métrique d'Einstein asymptotiquement hyperbolique complexe. Nous expliquons maintenant comment faire en sorte que la perturbation des équations de Seiberg–Witten (21) s'évanouisse et comment généraliser les résultats obtenus pour ces nouvelles constructions.

4.1. Modification des constructions. D'après la proposition 3.1 de [BiH] (nous nous référons largement à sa démonstration dans ce qui suit), il existe une métrique de Kähler–Einstein asymptotiquement hyperbolique complexe $(\bar{g}, \bar{J})$ d'infini conforme γ définie sur le bout de M par une série formelle. Nous supposons pour simplifier dans la suite de cette section comme si la métrique était exactement Kähler–Einstein plutôt que définie par une série formelle bien que nos résultats restent vrais en toute généralité.

Précisons quelques points sur la construction de $(\bar{g}, \bar{J})$. La structure complexe $\bar{J}$ est obtenue en modifiant J le long de la distribution de contact : la différence entre J et $\bar{J}$ est paramétrisée par un tenseur $\theta \in H^{0,1} \otimes H_{1,0}$ avec $H^{0,1}$ les formes de type $(0,1)$ et $H_{1,0}$ les vecteurs de type $(1,0)$ de la distribution de contact tel que

$$T_{0,1}^{\bar{J}} = \{X + \theta(X), X \in T_{0,1}^J\}.$$

De plus on sait que par construction $\theta = O(e^{-2t})$. Les tenseurs $\theta_\tau = (1 - \chi_{\tau-1})\theta$ définissent une famille de structures presque complexes qui réalisent un recollement entre $\bar{J}$ pour $t \leq \tau-2$ et J pour $t \geq \tau-1$. On en déduit une famille $\tilde{J}_\tau$ de structures presque complexes en remplaçant J par J_τ pour $t \geq \tau-1$.

La métrique presque kählérienne $\hat{g} = dt^2 + \text{sh}^2(2t)\eta^2 + \text{sh}^2(t)\gamma$ découle, comme dans le cas hyperbolique complexe (5), d'un potentiel $U = -\frac{1}{2} \ln(1 - \text{th}^2 t)$ avec $\omega^{\hat{g}} = i\partial\bar{\partial}U$. La métrique $\bar{g}$ est définie en modifiant ce potentiel par $\omega^{\bar{g}} = i\partial\bar{\partial}(U + F)$ où $F = O(e^{-2t})$. De façon analogue au cas de la structure presque complexe, la suite de potentiels $F_\tau = (1 - \chi_{\tau-1})F$, permet de définir une suite de métriques presque kählériennes $\tilde{g}_\tau$ relativement à $\tilde{J}_\tau$ recollant la métrique $\bar{g}$ pour $t \leq \tau-2$ et $\hat{g}_\tau$ pour $t \geq \tau-1$.

Toutes nos constructions gardent un sens en remplaçant la suite $(\hat{g}_\tau, J_\tau)$ de la section 2.4 par $(\tilde{g}_\tau, \tilde{J}_\tau)$. On définit alors la suite d'approximations g_τ de g par (14). Comme $\bar{g}$ et $\hat{g}$ diffèrent par un $O(e^{-2t})$, on en déduit que l'ensemble des résultats de la section 2.5, le corollaire 10 et le lemme 11 restent vrais pour les nouvelles métriques g_τ . Il s'en suit que les

solutions de Seiberg–Witten perturbées associées aux métriques $\hat{g}_\tau$ admettent une borne C^0 suivant le lemme 5.

Si g est une métrique d'Einstein asymptotiquement hyperbolique complexe, elle satisfait une équation elliptique modulo l'action des difféomorphismes. Un examen précis de cette équation mené par Biquard et Herzlich donne des renseignements supplémentaires sur le comportement à l'infini de g :

Résultat (Biquard–Herzlich). *Si g est une métrique d'Einstein asymptotiquement hyperbolique, alors quitte à faire agir un difféomorphisme, on a près de l'infini*

$$(46) \quad g = \bar{g} + k + O(e^{-(4+\varepsilon)t}), \text{ où } \varepsilon > 0$$

et $k = e^{-2t}k_0$ avec k_0 une 2-forme bilinéaire symétrique sur la distribution de contact de Y , anticommutant à la structure complexe. Autrement dit $i_{\eta^\#}k_0 = 0$ et $k_0(J\cdot, J\cdot) = -k_0$.

Comme la métrique $\bar{g}$ est de Kähler–Einstein, l'équation $F_B^{+\bar{g}} = q(\Phi_0)$ est vérifiée. On en déduit que $F_B^{+g} = q(\Phi_0) + \varpi$, avec $\varpi = O(e^{-4t})$. Les équations de Seiberg–Witten perturbées sont maintenant définie par

$$\begin{aligned} D_{A_\tau}^{g_\tau} \Phi_\tau &= 0 \\ F_{A_\tau}^+ - q(\Phi_\tau) &= F_{B_\tau}^+ - q(\Phi_0) + \varpi_\tau \end{aligned}$$

où B_τ est la connexion de Chern induite par la métrique $(\tilde{g}_\tau, \tilde{J}_\tau)$ sur le fibré anti-canonique et $\varpi_\tau = (1 - \chi_\tau)\varpi$. La perturbation $F_{B_\tau}^+ - q(\Phi_0) + \varpi_\tau$ est maintenant nulle pour $t \leq \tau - 2$. À la limite on obtient les équations de Seiberg–Witten non perturbées (2) pour la métrique g .

Avec les mêmes démonstrations que celles des propositions 6, 17, on obtient en utilisant le résultat de Biquard–Herzlich

Proposition 18. *Soit g une métrique d'Einstein asymptotiquement hyperbolique complexe et soit (A_τ, Φ_τ) une suite de solutions des équations de Seiberg–Witten perturbées pour les approximations g_τ . Alors pour T suffisamment grand, l'énergie $E_T^\tau(A_\tau, \Phi_\tau)$ est uniformément bornée.*

Comme la borne uniforme sur l'énergie est systématique, on a donc :

Proposition 19. *Soit g une métrique d'Einstein asymptotiquement hyperbolique complexe sur M , munie d'une structure spin^c adaptée. Soit (A_τ, Φ_τ) une suite des équations de Seiberg–Witten perturbées relatives aux approximations asymptotiquement plates g_τ de g . Quitte à faire des changements de jauge et à extraire une sous-suite, (A_τ, Φ_τ) converge sur tout compact de M vers une solution (A, Φ) des équations de Seiberg–Witten non perturbées (2) pour la métrique g telle que $\Phi - \Phi_0 \in L_1^2$, $a = A \otimes B^{-1} \in L_1^2$ et $d^*a = 0$ près de l'infini, avec (A_0, Φ_0) la solution standard des équations pour une métrique formelle Kähler–Einstein $\bar{g}$, asymptotiquement hyperbolique complexe, définie sur le bout de M .*

Si g est d'Einstein, nous allons montrer, quitte à faire un changement de jauge, que la solution (A, Φ) possède une forte décroissance à l'infini en nous servant de (46).

4.2. Décroissance des solutions. Par commodité, on considère maintenant des solutions (A, Φ) des équations de Seiberg–Witten, où A est par convention une connexion définie sur la racine carrée du fibré déterminant $\mathbb{C}^{1/2}$. Nous retrouvons ainsi une solution des équations précédentes par un simple changement de variables $(A, \Phi) \rightarrow (A \otimes A, \sqrt{2}\Phi)$ et l'action du groupe de jauge $\mathcal{G} = \text{Map}(M, S^1)$ est donnée par

$$u \cdot (A, \Phi) = (A + \frac{du}{u}, u^{-1}\Phi).$$

En linéarisant les équations de Seiberg–Witten et l'action du groupe de jauge $\mathcal{G}$ en la solution standard (B, Φ_0) des équations pour la métrique de Kähler Einstein $\bar{g}$, on obtient les opérateurs

$$\begin{aligned}\delta_1(u) &= (du, -u\Phi_0) \\ \delta_2(a, \varphi) &= (d^+a - \{\Phi_0 \otimes \varphi^* + \varphi \otimes \Phi_0^*\}_0, D_B\varphi + a \cdot \Phi).\end{aligned}$$

L'adjoint formel de δ_1 est donné par

$$\delta_1^*(a, \varphi) = d^*a - i\text{Im}(\Phi_0^*\varphi).$$

On définit l'opérateur $\mathcal{D} = \delta_1^* + \delta_2$ et son laplacien $P = \mathcal{D}^*\mathcal{D}$. En notant l'espace de Sobolev à poids $L_{k,\delta}^2 = e^{-\delta t}L_k^2$, on a la proposition :

Proposition 20. *Il existe des constantes $\varepsilon, c, T > 0$ telles que pour tout couple (a, φ) à support compact défini sur $[T, +\infty[$ nul en $t = T$ et tout $\delta \in [0, 2 + \varepsilon]$ on ait*

$$(47) \quad \int |\mathcal{D}(a, \varphi)|^2 e^{2\delta t} \text{vol} \geq c \int (|\nabla a|^2 + |\nabla_{A_0}\varphi|^2 + |a|^2 + |\varphi|^2) e^{2\delta t} \text{vol},$$

où $\mathcal{D}$ est l'opérateur des équations linéarisées modulo l'action du groupe de jauge en (B, Φ_0) .

Il n'est pas difficile d'en déduire le corollaire suivant en notant

$$\|\sigma\|_{L_{k,\delta}^2(g)}^2 = \sum_{j=0}^k \|(\nabla^k \sigma) e^{\delta t}\|_{L^2(g)}^2.$$

Corollaire 21. *Il existe des constantes $\varepsilon, T, c_k > 0$ telles que pour toute configuration (a, φ) à support compact nulle en $t = T$ et tout $\delta \in [0, 2 + \varepsilon]$ on ait*

$$(48) \quad \|\mathcal{D}(a, \varphi)\|_{L_{k-1,\delta}^2(g)} \geq c_k \|(a, \varphi)\|_{L_{k,\delta}^2(g)}.$$

Un procédé de bootstrapping, dans le cas où g est une métrique d'Einstein, va nous permettre en s'appuyant sur ce corollaire d'obtenir une borne L_k^2 sur une solution (A, Φ) des équations de Seiberg–Witten non perturbées (2) en partant d'une borne L_1^2 .

Si la métrique vérifie $g = \bar{g} + O(e^{-(4+\varepsilon)t})$, on en déduit automatiquement que

$$(49) \quad D_A^g \Phi = D_A^{\bar{g}} \Phi + O(e^{-(4+\varepsilon)t}) \cdot \Phi,$$

où le $O(e^{-(4+\varepsilon)t})$ est la 1-forme donnée par $\nabla_A^g - \nabla_A^{\bar{g}}$ et agissant sur Φ par produit de Clifford. En utilisant le fait que Φ est borné en norme C^0 on en déduit $O(e^{-(4+\varepsilon)t}) \cdot \Phi$ est aussi un $O(e^{-(4+\varepsilon)t})$.

Mais d'après (46), la métrique g comporte également une perturbation donnée par un tenseur $k = O(e^{-4t})$ défini sur la distribution de contact et anticommute avec J . La variation de l'opérateur de Dirac en fonction de la métrique est calculée précisément dans [BG] au théorème 21 : en identifiant les fibrés de spineurs par un isomorphisme canonique à celui réalisé par la métrique $\bar{g}$, la variation infinitésimale de l'opérateur de Dirac pour une variation k de métrique $\bar{g}$ est donnée par

$$\dot{D}_A^{\bar{g}} \Phi = -\frac{1}{2} Cl(\nabla_K^{A,\bar{g}} \Phi) + \frac{1}{4}(\delta^{\bar{g}} k + d\text{tr}_{\bar{g}} k) \cdot \Phi,$$

où K est l'endomorphisme de TM défini par $\bar{g}^{-1}k$ et Cl est la contraction par le produit de Clifford. On applique cette identité à B et Φ_0 et puisque Φ_0 est parallèle le premier terme est nul. Comme k anticommute à J sa trace par rapport à $\hat{g}$ est nulle. Par ailleurs on a $\delta^{\hat{g}} k = O(e^{-5t})$ (cf. formule (7.16) de [BiH] en faisant attention à la convention différente

sur la courbure scalaire). Comme $\hat{g} - \bar{g} = O(e^{-2t})$, on en déduit que pour un accroissement $k = O(e^{-4t})$, on a $\delta^{\bar{g}}k + d\text{tr}_{\bar{g}}k = O(e^{-5t})$ d'où

$$\dot{D}_B^{\bar{g}}\Phi_0 = O(e^{-5t}).$$

Les termes quadratiques et d'ordre supérieur dans la variation de l'opérateur de Dirac par rapport à la métrique $(D_A^g - D_A^{\bar{g}})\Phi$ ont une décroissance encore plus forte. On en déduit finalement que la formule (49) reste valable pour toute métrique d'Einstein asymptotiquement hyperbolique complexe.

Notons que le tenseur k correspond à une déformation infinitésimale de la métrique $\bar{g}$ laissant la forme symplectique invariante. Il est facile d'en déduire que l'équation de Seiberg-Witten portant sur la courbure est perturbée par un terme à décroissance en $O(e^{-(4+\varepsilon)t})$ lorsqu'on passe de $\bar{g}$ à g .

Rappelons que (A, Φ) est dans une jauge de Hodge près de l'infini et les équations de Seiberg-Witten s'écrivent par conséquent sous la forme

$$(50) \quad \mathcal{D}(a, \varphi) + Q(a, \varphi) + O(e^{-(4+\varepsilon)t}) = (i\text{Im}\langle \Phi_0, \varphi \rangle, 0, 0)$$

où $\varphi = \Phi - \Phi_0$, $a = A \otimes B^{-1}$, Q est un terme quadratique et $\mathcal{D}$ est l'opérateur des équations de Seiberg-Witten pour la métrique $\bar{g}$ linéarisées en (B, Φ_0) . Le terme quadratique $Q(a, \varphi)$ admet une borne L_1^2 . En effet

$$Q(a, \varphi) = (0, a \cdot \varphi, q(\varphi, \varphi));$$

maintenant $\nabla q(\varphi, \varphi) = 2q(\nabla\varphi, \varphi) \in L^2$ puisque $\nabla\varphi \in L^2$ et φ borné en norme C^0 et de même $(\nabla a) \cdot \varphi \in L^2$ car $\nabla a \in L^2$. Il nous reste à voir que $a \cdot \nabla\varphi \in L^2$. Par l'inclusion de Sobolev $L_1^2 \subset L^4$, on a $a \in L^4$. Par ailleurs, on a d'après les équations de Seiberg-Witten $D_B\varphi = -a \cdot \varphi$. Comme $\varphi \in C^0$, on en déduit que $D_B\varphi \in L^4$. De plus $\varphi \in L^4$ et par ellipticité de l'opérateur de Dirac, on en déduit une borne L_1^4 sur φ . Finalement $\nabla\varphi \in L^4$ et on a une borne L^2 sur $\nabla Q(a, \varphi)$.

Remarque : puisque les opérateurs D_B est défini à partir d'une métrique asymptotiquement hyperbolique complexe, les constantes de régularité elliptique locale peuvent être choisies indépendamment du centre des boules ce qui justifie le raisonnement de bootstrapping ci-dessus.

D'après (50) on a donc une borne L_1^2 sur $\mathcal{D}(a, \varphi)$. On en déduit une borne L_1^2 sur $\mathcal{D}(\chi_T(a, \varphi))$, où χ_T est la fonction de troncature définie à la section 2.4, puis via le corollaire 21 on en déduit que (a, φ) est dans L_2^2 . En réitérant ce raisonnement, on montre que $(a, \varphi) \in L_k^2$ pour tout k .

Corollaire 22. *La solution (A, Φ) des équations de Seiberg-Witten non perturbées (2) pour la métrique d'Einstein asymptotiquement hyperbolique complexe g , en jauge de Hodge près de l'infini, obtenue dans la proposition 19 vérifie $A \otimes B^{-1} \in L_k^2$ et $\Phi - \Phi_0 \in L_k^2$ pour tout k .*

On a maintenant obtenu une régularité suffisante sur la solution (A, Φ) pour fixer une jauge de Coulomb près de l'infini.

Lemme 23. *Soit (A, Φ) une configuration telle que $A - B \in L_k^2$ et $\Phi - \Phi_0 \in L_k^2$ avec $k \geq 2$. Alors on peut faire un changement de jauge sur le bout de $M \cap \{t > T\}$, avec T suffisamment grand, de la forme e^u , avec $e^u - 1 \in L_{k+1}^2$ tel qu'on ait $\delta_1^*(A - B, \Phi - \Phi_0) = 0$, où δ_1 est l'action linéarisée du groupe de jauge en (B, Φ_0) .*

Démonstration. — On introduit les espaces W_k qui sont les complétés pour la norme L_k^2 des fonctions (formes, sections) à support compact définies pour $t \geq T$ et nulles en $t = T$. On considère l'action du groupe de jauge entre les espaces

$$\begin{aligned} \{(A, \Phi)/a, \varphi \in W_k \text{ et } \delta_1^*(a, \varphi) = 0\} \times \{u \in W_{k+1}\} &\longrightarrow \{(A, \Phi)/a, \varphi \in W_k\} \\ ((A, \Phi), u) &\longmapsto (A + du, e^{-u}\Phi), \end{aligned}$$

où l'on a noté $(a, \varphi) = (A \otimes B^{-1}, \Phi - \Phi_0)$. Cette flèche est définie à condition de choisir $k \geq 3$, afin d'avoir l'inclusion continue $L_k^2 \subset C^0$. Nous allons voir que c'est un difféomorphisme local près de $((B, \Phi_0), 0)$. Il suffit de montrer que la différentielle en ce point est un isomorphisme, c'est à dire de montrer qu'étant donné $(\dot{a}, \dot{\varphi}) \in W_k$ il existe un unique $u \in W_{k+1}$ qui résout infinitésimalement le problème de la jauge de Coulomb $\delta_1^* \delta_1(u) = -\delta_1^*(\dot{a}, \dot{\varphi})$. Il suffit donc de montrer que $\delta_1^* \delta_1 : W_{k+1} \rightarrow W_{k-1}$ est un isomorphisme. On calcule aisément

$$\delta_1^* \delta_1(u) = d^* du + |\Phi_0|^2 u$$

d'où

$$\int \langle \delta_1^* \delta_1(u), u \rangle \text{vol} \geq |\Phi_0|^2 \int |u|^2 \text{vol};$$

et on en déduit une constante $c > 0$ telle que

$$(51) \quad \|u\|_{L^2} \leq c \|\delta_1^* \delta_1(u)\|.$$

Par ailleurs, compte tenu du fait que la métrique est asymptotiquement hyperbolique, les constantes c_k des estimations elliptiques locales sur les boules de rayon 1

$$\|u\|_{L_{k+2}^2} \leq c_k \left(\|u\|_{L^2} + \|\delta_1^* \delta_1(u)\|_{L_k^2} \right)$$

peuvent être choisie indépendamment du centre de la boule. En partant de (51), on en déduit des constantes c'_k telles que

$$\|u\|_{L_{k+2}^2} \leq c'_k \|\delta_1^* \delta_1(u)\|_{L_k^2},$$

où les normes sont prises sur M tout entier ; l'opérateur $\delta_1^* \delta_1$ est donc un isomorphisme.

Soit (A, Φ) une configuration telle que dans l'énoncé du corollaire. Notons $(a, \varphi) = (A \otimes B^{-1}, \Phi - \Phi_0)$ et posons $A_T = B + \chi_T a$ et $\Phi_T = \Phi_0 + \chi_T \varphi$ où χ_T est la fonction de troncature définie à la fin de la section 2.4. Lorsque T tend vers l'infini, (A_T, Φ_T) tend vers (B, Φ_0) en norme L_k^2 . On en déduit la jauge de Coulomb souhaitée pour T suffisamment grand. $\square$

Remarque : soit σ une section de fibré (forme, spineur) telle que $\sigma \in L_{k,\delta}^2$. Alors

$$\sigma(t) = - \int_t^\infty e^{-(4+2\delta)t} (\nabla_{\partial_t} \sigma) e^{(4+2\delta)t} dt;$$

par inégalité de Cauchy-Schwarz, il vient

$$(52) \quad |\sigma(t)|^2 \leq \frac{e^{-2(2+\delta)t}}{4+2\delta} \int_t^\infty |\nabla_{\partial_t} \sigma|^2 e^{(4+2\delta)t} dt,$$

En utilisant l'inclusion continue $L_2^2 \subset C^0$ sur Y^3 , on en déduit en intégrant sur Y que $\sigma, \nabla \sigma, \dots, \nabla^{k-3} \sigma$ sont des $O(e^{-(2+\delta)t})$

En particulier, on sait automatiquement que pour la solution des équations de Seiberg-Witten obtenue dans la proposition 17, placée dans une jauge de Coulomb près de l'infini via le lemme 23, $A - B$ et $\Phi - \Phi_0$ et leurs dérivées ont une décroissance en $O(e^{-2t})$.

Du corollaire 21, nous déduisons maintenant le résultat souhaité pour les métriques d'Einstein asymptotiquement hyperbolique.

Corollaire 24. *Soit $(A, \Phi) = (B + a, \Phi_0 + \varphi)$ une solution des équations de Seiberg-Witten pour une métrique d'Einstein g asymptotiquement hyperbolique complexe avec $a, \varphi \in L_1^2$. Alors il existe un $\varepsilon > 0$ suffisamment petit tel que dans une jauge de Coulomb près de l'infini, a, φ et leurs dérivées d'ordre arbitrairement grand ont une décroissance en $O(e^{-(4+\varepsilon)t})$.*

Démonstration. — On peut quitte à multiplier par une fonction de troncature supposer que a, φ est nulle en $t = T$. Plaçons nous dans une jauge telle que $\delta_1^*(a, \varphi) = 0$ près de l'infini

suyant lemme 23. En reprenant la discussion menant à (50), on voit que les équations de Seiberg-Witten s'écrivent près de l'infini en jauge de Coulomb

$$(53) \quad \mathcal{D}(a, \varphi) + Q(a, \varphi) + O\left(e^{-(4+\varepsilon)t}\right) = 0.$$

A partir de cette identité, un argument de bootstrapping basé sur le corollaire 21 et la remarque (52) va nous donner la décroissance voulue : on sait déjà que $a, \varphi \in L_k^2$ et leurs dérivées jusqu'à l'ordre $k-3$ ont une décroissance en e^{-2t} ; on en déduit en utilisant l'équation (53) que $\mathcal{D}(a, \varphi) = O(e^{-4t})$ (où le O porte sur les dérivées jusqu'à l'ordre $k-3$). On a donc $\mathcal{D}(a, \varphi) \in L_{k-3, 7/4}^2$ et on en déduit en utilisant le corollaire 21 que (a, φ) est lui aussi dans $L_{k-3, 7/4}^2$; c'est donc un $O(e^{-7/4t})$ à l'ordre $k-6$ par la remarque (52). On réitère le raisonnement, précédent : $Q(a, \varphi)$ est un $O(e^{-7/2t})$ à l'ordre $k-6$ et en choisissant une constante $0 < \varepsilon' \leq \min(\varepsilon, 8)$ on en déduit d'après (50) que $D(a, \varphi) = O(e^{-(4+\varepsilon')t})$. On applique à nouveau le corollaire 21 avec $4 < \delta < 4 + \varepsilon'$ et on en déduit que $(a, \varphi) = O(e^{-(4+\varepsilon')t})$ à l'ordre $k-6$, d'où le résultat en partant de k suffisamment grand. $\square$

On déduit immédiatement de la proposition 19 et du corollaire 24 le théorème suivant :

Théorème 25. *Soit g une métrique d'Einstein asymptotiquement hyperbolique et g_τ sa suite d'approximations asymptotiquement plates sur une variété orientable M^4 munie d'une structure spin^c adaptée. Soit (A_τ, Φ_τ) une suite de solutions des équations de Seiberg-Witten perturbées (20,21) associées aux métriques g_τ . Quitte à faire des changements de jauge et à extraire une sous suite, on peut supposer que (A_τ, Φ_τ) converge sur tout compact au sens C^∞ vers une solution (A, Φ) des équations de Seiberg-Witten non perturbées,*

$$\begin{aligned} D_A^g \Phi &= 0 \\ F_A^+ &= q(\Phi), \end{aligned}$$

telle que $A \otimes B^{-1}$, $\Phi - \Phi_0$ et leurs dérivées sont des $O\left(e^{-(4+\varepsilon)t}\right)$ avec $\varepsilon > 0$.

Le théorème 2 est une reformulation de ce dernier résultat sans la technique.

4.3. Laplacien de Seiberg-Witten. La fin de cette section est dédiée à la démonstration de la proposition 20. Nous commençons pas examiner précisément l'opérateur P dans un lemme calculatoire.

Lemme 26. *Pour une métrique hermitienne et des champs (a, φ) nuls en $t = T$, le laplacien P des équations de Seiberg-Witten linéarisées en (B, Φ_0) relativement à la métrique de Kähler-Einstein $\bar{g}$ vérifie*

$$(54) \quad \int_{t>T} \langle P(a, \varphi), (a, \varphi) \rangle e^{2\delta t} \text{vol}^{\bar{g}} = \int_{t>T} \left\{ \langle \Delta a, a \rangle + \langle \Delta \alpha, \alpha \rangle + \langle \Delta \gamma, \gamma \rangle - \frac{s}{2}(|a|^2 + |\alpha|^2 + |\gamma|^2) \right\} e^{2\delta t} \text{vol}^{\bar{g}}.$$

Démonstration. — Pour ce calcul, nous aurons besoin des résultats suivants ou on utilise la convention $\langle A, B \rangle = \frac{1}{2} \text{tr}_{\mathbb{C}} A^* B$ pour le produit hermitien sur $\text{End}(W)$:

Lemme 27. *Étant données Φ , T , η des sections de W^+ , $\text{End}_0(W^+)$, $\Lambda^{2,+}X$, on a :*

$$(55) \quad |\rho(\eta)|^2 = 2|\eta|^2$$

$$(56) \quad |\{\Phi^* \otimes \Phi\}_0|^2 = \frac{1}{4}|\Phi|^4$$

$$(57) \quad \langle T, \{\Phi^* \otimes \varphi + \varphi^* \otimes \Phi\}_0 \rangle = \frac{1}{2} \langle T\Phi, \varphi \rangle + \frac{1}{2} \langle T\varphi, \Phi \rangle$$

$$(58) \quad |\Phi|^2 |\varphi|^2 = |\{\Phi^* \otimes \varphi + \varphi^* \otimes \Phi\}_0|^2 + |\text{Im} \langle \Phi, \varphi \rangle|^2.$$

Nous noterons dans ce qui suit $f = i_{\partial_t} a$. On a alors la formule de Leibniz

$$\mathcal{D}[(a, \varphi)e^{2\delta t}] = e^{2\delta t} \mathcal{D}(a, \varphi) + 2\delta e^{2\delta t} (-f, \rho(dt \wedge a)^+, dt \cdot \varphi),$$

donc

$$(59) \quad \int \langle P(a, \varphi), (a, \varphi) \rangle e^{2\delta t} \text{vol} = \int |\mathcal{D}(a, \varphi)|^2 + 2\delta \langle \mathcal{D}(a, \varphi), (-f, \rho(dt \wedge a)^+, dt \cdot \varphi) \rangle e^{2\delta t} \text{vol}.$$

Calculons le premier terme :

$$\begin{aligned} |\mathcal{D}(a, \varphi)|^2 &= |d^* a|^2 + |\text{Im} \langle \Phi, \varphi \rangle|^2 - 2 \langle d^* a, i \text{Im} \langle \Phi, \varphi \rangle \rangle \\ &\quad + 2|d^+ a|^2 + |\{\Phi^* \otimes \varphi + \varphi^* \otimes \Phi\}_0|^2 - 2 \langle d^+ a, \{\Phi^* \otimes \varphi + \varphi^* \otimes \Phi\}_0 \rangle \\ &\quad + |D_A \varphi|^2 + |a|^2 |\Phi|^2 + 2 \langle D_A \varphi, a \cdot \Phi \rangle. \end{aligned}$$

D'après (57) et (58) il vient

$$\begin{aligned} |\mathcal{D}(a, \varphi)|^2 &= |d^* a|^2 + 2|d^+ a|^2 + |D_A \varphi|^2 + 2 \langle D_A \varphi, a \cdot \Phi \rangle \\ &\quad - 2 \langle (d^* a + d^+ a) \cdot \Phi, \varphi \rangle + |\Phi|^2 (|a|^2 + |\varphi|^2). \end{aligned}$$

Maintenant, intégrons par parties le terme $\langle D_A \varphi, a \cdot \Phi \rangle$;

$$\int \langle D_A \varphi, a \cdot \Phi \rangle e^{2\delta t} \text{vol} = \int 2\delta \langle \varphi, \partial_t \cdot a \cdot \Phi \rangle e^{2\delta t} + \langle \varphi, D_A a \cdot \Phi \rangle e^{2\delta t} \text{vol},$$

or

$$(60) \quad D_A(a \cdot \Phi) = (da + d^* a) \cdot \Phi - a \cdot D_A \Phi - 2 \text{tr } a \otimes \nabla^A \Phi.$$

En effet : choisissons une base locale (e_i) orthonormale parallèle en un point ; alors

$$\begin{aligned} D_A(a \cdot \Phi) &= \sum_{i,j} e_i \cdot \nabla_{e_i}^A (a_j e_j \cdot \Phi) = \sum_{i,j} da_j(e_i) e_i \cdot e_j \cdot \Phi + a_j e_i \cdot \nabla_{e_i}(e_j) \cdot \Phi + a_j e_i \cdot e_j \nabla_{e_i}^A \Phi \\ &= (da + d^* a) \cdot \Phi - a \cdot D_A \Phi - 2 \sum_i a_i \nabla_{e_i}^A \Phi, \end{aligned}$$

d'où le résultat.

Notons que $\langle a \otimes \varphi, \nabla^A \Phi \rangle = \langle \varphi, \text{tr } a \otimes \nabla^A \Phi \rangle$; alors

$$\begin{aligned} (61) \quad \int |\mathcal{D}(a, \varphi)|^2 e^{2\delta t} \text{vol} &= \int |d^* a|^2 + 2|d^+ a|^2 + |D_A \varphi|^2 + |\Phi|^2 (|a|^2 + |\varphi|^2) \\ &\quad + 4\delta \langle \varphi, dt \cdot a \cdot \Phi \rangle - 2 \langle \varphi, a \cdot D_A \Phi \rangle - 4 \langle a \otimes \varphi, \nabla^A \Phi \rangle e^{2\delta t} \text{vol}. \end{aligned}$$

Dans le cas où $(A, \Phi) = (B, \Phi_0)$, on a $|\Phi|^2 = -\frac{s}{2}$, $D_A \Phi = 0$ et $\nabla^A \Phi = 0$; les deux derniers termes de l'intégrale sont donc nuls.

Maintenant,

$$2\delta \int \langle \mathcal{D}(a, \varphi), (-f, \rho(\partial_t \wedge a)^+, dt \cdot \varphi) \rangle e^{2\delta t} \text{vol} = 2\delta \int \langle d^*a, -f \rangle + \langle f, i\text{Im}\langle \Phi, \varphi \rangle \rangle + \langle D_A \varphi, dt \cdot \varphi \rangle \\ + \langle a \cdot \Phi, dt \cdot \varphi \rangle + \langle \rho^+(\partial_t \wedge a), \rho^+(da) - \{\Phi^* \otimes \varphi + \varphi^* \otimes \Phi\}_0 \rangle e^{2\delta t} \text{vol}$$

ce qui d'après le lemme (27) est égal à

$$(62) \quad 2\delta \int \langle d^*a, -f \rangle + 2\langle (dt \wedge \gamma)^+, d^+a \rangle + 2\langle a \cdot \Phi, dt \cdot \varphi \rangle + \langle D_A \varphi, dt \cdot \varphi \rangle e^{2\delta t} \text{vol}.$$

On applique la formule de Lichnerowicz :

$$(63) \quad \int |D_A \varphi|^2 e^{2\delta t} \text{vol} = \int \langle \nabla_A^* \nabla_A \varphi, \varphi \rangle + \frac{s}{4} |\varphi|^2 + \langle F_A^+ \cdot \varphi, \varphi \rangle + 2\delta \langle dt \cdot D_A \varphi, \varphi \rangle e^{2\delta t} \text{vol}.$$

En décomposant $\varphi = (\alpha, \gamma)$, $\Phi = (\sqrt{-\frac{s}{2}}, 0)$ il vient

$$\langle F_A^+ \cdot \varphi, \varphi \rangle = \langle q(\Phi) \varphi, \varphi \rangle = \frac{s}{4} (|\gamma|^2 - |\alpha|^2).$$

Finalement, en intégrant par parties on voit apparaître

$$(64) \quad \int \langle P(a, \varphi), (a, \varphi) \rangle e^{2\delta t} \text{vol} = \int \left\{ \langle \Delta a, a \rangle + \langle \Delta \alpha, \alpha \rangle + \langle \Delta \gamma, \gamma \rangle - \frac{s}{2} (|\alpha|^2 + |\alpha|^2 + |\gamma|^2) \right\} e^{2\delta t} \text{vol},$$

où Δ désigne le laplacien de la métrique métrique de Kähler–Einstein $\bar{g}$ sur les formes. $\square$

Il s'agit maintenant d'analyser chacun des 3 laplaciens intervenant dans le lemme précédent. Comme la métrique $\bar{g}$ n'a pas de formule explicite, nous allons plutôt faire les calculs dans un premier temps par rapport à la métrique asymptotiquement hyperbolique complexe $\hat{g} = dt^2 + \text{sh}^2(2t)\eta + \text{sh}^2(t)\gamma$, et de la structure presque complexe J .

Nous avons déjà traité la question des 1-formes dans un cadre plus général : on part de (42) appliqué à la métrique $\hat{g}$ et une 1-forme à support compact $a = f dt + q \text{sh}(2t)\eta + b$, où $i_{\partial_t} b = i_R b = 0$, nulle en $t = T$. Dans ce cas, $\frac{\xi'_1}{2\xi_1} = 1 + O(e^{-t})$, $\frac{(\xi'_2)^2 + 2\xi_2 \xi''_2}{\xi_2^2} = 3 + O(e^{-t})$ et on obtient

$$(65) \quad \int_t \langle \Delta^{\hat{g}} a, a \rangle e^{2\delta t} \text{vol}^{\hat{g}} \geq \int_t \left\{ \left\langle (-\partial_t^2 + 2h\partial_t - 1 + O(e^{-t}))f, f \right\rangle \right.$$

$$(66) \quad \left. + \left\langle (-\partial_t^2 + 2h\partial_t - 1 + O(e^{-t}))q, q \right\rangle \right.$$

$$(67) \quad \left. + \left\langle (-\nabla_{\partial_t}^2 + 2h\nabla_{\partial_t} - 3 + O(e^{-t}))b, b \right\rangle \right\} e^{2\delta t} \text{vol}^{\hat{g}}.$$

Soit Δ^h le laplacien défini à l'aide de la différentielle restreinte aux directions de la structure de contact et de l'opérateur de Hodge sur la structure de contact donné par $b \wedge *b = \text{sh}^2(t)d\eta$. Soit le champ de vecteurs $x = \text{sh}^{-1}(2t)R$. Un calcul direct montre que le laplacien sur les fonctions est donné sur le bout de M par

$$\Delta^{\hat{g}} \alpha = (-\partial_t^2 + 2h - x^2 + \Delta^h) \alpha.$$

On en déduit en intégrant par parties sur Y que

$$(68) \quad \int_t \langle \Delta^{\hat{g}} \alpha, \alpha \rangle e^{2\delta t} \text{vol}^{\hat{g}} \geq \int_t \left\langle (-\partial_t^2 + 2h\partial_t) \alpha, \alpha \right\rangle e^{2\delta t} \text{vol}^{\hat{g}}.$$

Il faut maintenant s'occuper du laplacien sur les $(0, 2)$ formes. Pour la métrique $\bar{g}$, le laplacien sur les $(0, 2)$ formes est donné via les identités kählériennes par $\Delta \gamma = 2\bar{\partial} \bar{\partial}^* \gamma$; nous

allons donc plutôt nous intéresser à ce laplacien de Dolbeaut par rapport à la métrique $\hat{g}$. On définit le champ de vecteur et la 1-forme différentielle de types $(1, 0)$

$$\mathcal{X} = \frac{\partial_t - ix}{2} \quad \text{et} \quad \Omega = dt + i \operatorname{sh}(2t)\eta.$$

On vérifie facilement que

$$(69) \quad d\Omega = \bar{\partial}\Omega = \frac{2i}{\operatorname{th}(2t)} dt \wedge \operatorname{sh}(2t)\eta + \frac{2i}{\operatorname{th}(t)} \operatorname{sh}^2(t)d\eta = 2i\omega^{\hat{g}} + O(e^{-t}),$$

où $\omega^{\hat{g}}$ est la forme de Kähler de $(\hat{g}, J)$. D'autre part $\partial\Omega = 0$.

Toute $(0, 2)$ -forme peut s'écrire de la manière suivante

$$\gamma = \bar{\Omega} \wedge \mu,$$

où μ est une famille de $(0, 1)$ -formes sur la distribution de contact. Maintenant, l'identité kählérienne $\Delta\gamma = 2\bar{\partial}\partial^*\gamma = -2i\bar{\partial}\Lambda\partial\gamma$ permet de calculer facilement le laplacien : tout d'abord $\partial\gamma = \partial\bar{\Omega} \wedge \mu - \bar{\Omega} \wedge \partial\mu$; en notant ∂^h les dérivations dans les directions de la distribution de contact, on a $\partial\mu = \Omega \wedge \mathcal{X} \cdot \mu + \partial^h\mu$. Par la formule (69), il vient

$$\partial\gamma = -2idt \wedge \operatorname{sh}(2t)\eta \wedge (\mathcal{X} + \operatorname{th}^{-1}(2t)) \cdot \mu - (\Lambda\partial^h\mu)\bar{\Omega} \wedge \operatorname{sh}^2(t)d\eta.$$

En contractant avec la forme de Kähler $\omega = dt \wedge \operatorname{sh}(2t)\eta + \operatorname{sh}^2(t)d\eta$, on obtient

$$\Lambda\partial\gamma = -\Lambda\partial^h\mu\bar{\Omega} - 2i(\mathcal{X} + \operatorname{th}^{-1}(2t)) \cdot \mu.$$

Alors

$$\Delta^{\hat{g}}\gamma = -2i\bar{\partial}\Lambda\partial\gamma = \bar{\Omega} \wedge \left[\Delta^h\mu - 4\bar{\mathcal{X}} \cdot \mathcal{X} \cdot \mu - 4\bar{\mathcal{X}} \cdot (\operatorname{th}^{-1}(2t)\mu) \right].$$

Or

$$4\bar{\mathcal{X}} \cdot \mathcal{X} = \partial_t^2 + x^2 + \frac{2i}{\operatorname{th}(2t)}x.$$

Comme $\partial_t \cdot \mu = \nabla_{\partial_t}\mu + \operatorname{th}^{-1}(t)\mu$, le laplacien s'écrit finalement

$$(70) \quad \Delta^{\hat{g}}\gamma = \bar{\Omega} \wedge \left[-\nabla_{\partial_t}^2 + 2h\nabla_{\partial_t} - x^2 - 4ix + \Delta^h - 3 + O(e^{-t}) \right] \cdot \mu,$$

où $\Delta^h\mu = -2i\bar{\partial}^h(\bar{\partial}^h)^*\mu$. Puis en intégrant par parties suivant Y , et en majorant

$$|x \cdot \mu|^2 - \langle 4ix \cdot \mu, \mu \rangle \geq -4|\mu|^2$$

on en déduit que

$$(71) \quad \int_t \langle \Delta^{\hat{g}}\gamma, \gamma \rangle e^{2\delta t} \operatorname{vol}^{\hat{g}} \geq \int_t \langle (-\nabla_{\partial_t}^2 + 2h\nabla_{\partial_t} - 7 + O(e^{-t}))\gamma, \gamma \rangle e^{2\delta t} \operatorname{vol}^{\hat{g}}.$$

4.4. Conclusion. Dans chacun des cas étudiés, le laplacien agit sur une forme σ de sorte que,

$$\int_t \langle (\Delta^{\hat{g}} - \frac{s}{2})\sigma, \sigma \rangle e^{2\delta t} \operatorname{vol}^{\hat{g}} \geq \int_t \langle (-\nabla_{\partial_t}^2 \sigma + 2h\nabla_{\partial_t}\sigma + \kappa)\sigma, \sigma \rangle e^{2\delta t} \operatorname{vol}^{\hat{g}}.$$

où d'après (65, 68, 71), κ est une constante telle que $\kappa \geq -s/2 - 7 + O(e^{-t}) = 5 + O(e^{-t})$. En intégrant par parties suivant t et en utilisant l'hypothèse de nullité de σ en $t = T$, il vient

$$\int_{t \geq T} \langle -\nabla_{\partial_t}^2 \sigma, \sigma \rangle + 2h \langle \nabla_{\partial_t} \sigma, \sigma \rangle e^{2\delta t} \operatorname{vol}^{\hat{g}} = \int 2\delta \langle \nabla_{\partial_t} \sigma, \sigma \rangle + |\nabla_{\partial_t} \sigma|^2 e^{2\delta t} \operatorname{vol}^{\hat{g}}.$$

Par ailleurs, pour $c > 0$

$$-2 \langle \nabla_{\partial_t} \sigma, \sigma \rangle \leq c^{-1} |\nabla_{\partial_t} \sigma|^2 + c |\sigma|^2.$$

En appliquant les deux inégalités précédentes, il vient

$$\begin{aligned} \int \langle (\Delta^{\hat{g}} - \frac{s}{2})\sigma, \sigma \rangle e^{2\delta t} \text{vol}^{\hat{g}} &\geq \int 2(\delta - c) \langle \nabla_{\partial_t} \sigma, \sigma \rangle + (\kappa - c^2) |\sigma|^2 e^{2\delta t} \text{vol}^{\hat{g}} \\ &\geq \int [2(\delta - c)(h - \delta) + (\kappa - c^2)] |\sigma|^2 e^{2\delta t} \text{vol}^{\hat{g}}. \end{aligned}$$

En choisissant $c = \delta - h$, on obtient l'inégalité

$$(72) \quad \int_{t \geq T} \langle (\Delta^{\hat{g}} - \frac{s}{2})\sigma, \sigma \rangle e^{2\delta t} \text{vol}^{\hat{g}} \geq \int_{t \geq T} (\kappa + h^2 - \delta^2 + O(e^{-2t})) |\sigma|^2 e^{2\delta t} \text{vol}^{\hat{g}};$$

compte tenu de l'inégalité $h \leq h_0 < 0$, le terme $\kappa + h^2 - \delta^2$ est positif si

$$0 \leq \delta < \sqrt{\kappa + h_0^2};$$

en choisissant T suffisamment grand, on a $\sqrt{\kappa + h_0^2} > 2$.

Les métriques $\hat{g}$ et $\bar{g}$ diffèrent par un $O(e^{-2t})$. En utilisant l'inégalité (72) et le lemme 26 on en déduit ainsi le lemme suivant :

Lemme 28. *Il existe $\varepsilon, c, T > 0$ tels que pour tout couple (a, φ) à support dans $\{t > T\} \times Y$ nul en $t = T$ et $\delta \in [0, 2 + \varepsilon]$ on ait*

$$\int \langle P(a, \varphi), (a, \varphi) \rangle e^{2\delta t} \text{vol}^{\bar{g}} \geq c \int (|\nabla a|^2 + |\nabla^B \varphi|^2 + |a|^2 + |\varphi|^2) e^{2\delta t} \text{vol}^{\bar{g}},$$

les normes étant prises par rapport à la métrique $\bar{g}$.

On peut maintenant facilement démontrer la proposition 20. *Démonstration de la proposition 20:* — D'après le lemme 28 et la formule (59), on a pour tout $\lambda > 0$

$$\int ((1 + \delta\lambda)|\mathcal{D}(a, \varphi)|^2 + \delta\lambda^{-1}(|\varphi|^2 + |a|^2)) \text{vol} \geq c \int (|\nabla a|^2 + |\nabla^A \varphi|^2 + |a|^2 + |\varphi|^2) e^{2\delta t} \text{vol};$$

en choisissant λ suffisamment grand, on en déduit la proposition. $\square$

5. DÉMONSTRATION DU THÉORÈME 1

On commence par une proposition similaire à celle du cas compact et qui est la clef de la démonstration.

Proposition 29. *Soit M^4 une variété orientée munie d'une métrique g d'Einstein asymptotiquement hyperbolique et d'une structure spin^c adaptée. Supposons que les équations de Seiberg-Witten associées admettent une solution (A, Φ) telle que dans le théorème 1.*

$$(73) \quad \int_M s^2 \text{vol} + 8F_A \wedge F_A \geq 0,$$

avec égalité si et seulement si la métrique est de Kähler-Einstein. Dans ce cas, on a $\nabla_A \Phi = 0$ et la structure complexe se déduit de g et F_A^+ .

Démonstration. — On procède comme sur les variétés compactes. D'après la formule de Lichnerowicz et les équations de Seiberg-Witten,

$$0 = 4\langle \nabla_A^* \nabla_A \Phi, \Phi \rangle + s|\Phi|^2 + |\Phi|^4.$$

On multiplie cette identité par la fonction de troncature $\psi_{t_0} = 1 - \chi_{t_0}$, où χ_{t_0} a été définie à la fin de la section 2.4. En appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, il vient

$$\int (\langle \nabla_A \Phi, d\psi_{t_0} \otimes \Phi \rangle + |\Phi|^4 \psi_{t_0}) \text{vol} \leq \left(\int s^2 \psi_{t_0} \text{vol} \int |\Phi|^4 \psi_{t_0} \text{vol} \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Puisque $\nabla_A \Phi = O(e^{-(4+\varepsilon)t})$ ce terme est L^1 et on en déduit en utilisant la borne C^0 sur Φ que $\int \langle \nabla_A \Phi, d\psi_{t_0} \otimes \Phi \rangle$ tend vers 0 lorsque t_0 tend vers l'infini. Il en résulte que

$$\int s^2 - |\Phi|^4 \text{vol} \geq 0,$$

avec égalité si et seulement si $\nabla_A \Phi = 0$. D'après les équations de Seiberg-Witten $|\Phi|^4 = 8|F_A^+|^2$. Puisque F_A est imaginaire pure, $|F_A^+|^2 \text{vol} = -F_A \wedge F_A + |F_A^-|^2 \text{vol}$, et on en déduit l'inégalité de la proposition. Le cas d'égalité entraîne que $F_A^- = 0$ et $\nabla^A \Phi = 0$ et on obtient alors une structure complexe à l'aide de la métrique et de la 2-forme autoduale parallèle $\sqrt{2}F_A/|F_A|$ pour laquelle la métrique est kählérienne. $\square$

Réciproquement, on a le lemme suivant :

Lemme 30. *Si M admet une métrique de Kähler-Einstein asymptotiquement hyperbolique $\bar{g}$, alors les équations de Seiberg-Witten pour toute métrique d'Einstein asymptotiquement symétrique g (relativement à la même structure de contact) et la structure spin^c canonique $\mathfrak{s}_0$ de $\bar{g}$ admettent une solution.*

Démonstration. — La métrique de Kähler-Einstein définit un remplissage symplectique de M avec son bord de contact Y à l'infini. D'après [KM], on a alors $SW(\mathfrak{s}_0) = 1$; on en déduit une suite de solutions (A_τ, Φ_τ) des équations perturbées pour les métriques g_τ approximant g . En appliquant le théorème 25, on obtient la solution voulue. $\square$

Finalement, sous les hypothèses du théorème 1, on obtient pour g une solution (A, Φ) des équations de Seiberg-Witten pour la structure spin^c canonique de $\mathbb{CH}^2$. Si B est la connexion de Chern de $K_{\mathbb{CH}^2}^{-1}$ pour métrique hyperbolique complexe, on sait alors que $F_B = \frac{is}{4}\omega_{\mathbb{CH}^2}$ et $W_{g^{\mathcal{H}}}^- = 0$ d'où

$$(74) \quad \int (s_{\mathcal{H}}^2 + 48|W_{g^{\mathcal{H}}}^-|^2) \text{vol}^{\mathcal{H}} + 8F_B \wedge F_B = 0$$

En choisissant une jauge où la décroissance est du type $A - B = O(e^{-(4+\varepsilon)t})$, on voit en appliquant la formule de Stokes que

$$\int F_A \wedge F_A - F_B \wedge F_B = 2 \int d((A - B) \wedge F_B) = 0.$$

Pour des métriques d'Einstein asymptotiquement hyperboliques, $2|W^-|^2 + \frac{s^2}{24}$ est l'intégrand de $2\chi - 3\tau(M)$ et diverge mais la différence entre les termes de bord pour la métrique g et pour $g^{\mathcal{H}}$ tend vers 0 d'après [BiH]. On en déduit d'après (74) que

$$\int (s_g^2 + 48|W_g^-|^2) \text{vol}^g + 8F_A \wedge F_A = 0,$$

ce qui entraîne d'après le lemme 29 que la métrique g est en réalité de Kähler-Einstein avec $W_g^- = 0$. Puisque g est de Kähler-Einstein et autoduale il s'agit par conséquent de la métrique hyperbolique complexe.

6. MONOPÔLES ET STRUCTURES CR

Le théorème 2 permet de montrer qu'il existe des liens importants entre la géométrie d'une variété Y^3 munie d'une structure CR et les variétés M^4 munies de métriques d'Einstein asymptotiquement hyperboliques complexes d'infini conforme Y . On dira que la variété d'Einstein M est un *remplissage* de Y . On a alors le corollaire suivant :

Corollaire 31 (Biquard, [Bi3]). *Soit Y^3 une variété munie d'une structure CR et M^4 une variété munie d'une métrique d'Einstein g asymptotiquement hyperbolique d'infini conforme Y . Supposons de plus M munie d'une structure spin^c adaptée $\mathfrak{s}$ avec un invariant de Kronheimer–Mrowka $SW(\mathfrak{s}) \neq 0$. On a alors l'inégalité de Miyaoka–Yau*

$$(75) \quad 0 \leq \chi(M) - 3\tau(M) + \nu(\partial_\infty M) = \frac{1}{8\pi^2} \int_M \left(3|W_g^-|^2 - |W_g^+|^2 + \frac{s_g^2}{24} \right) \text{vol}^g,$$

où ν est l'invariant de la structure CR à l'infini défini dans [BiH]. De plus on a égalité si et seulement si la métrique g est hyperbolique complexe.

Notons que l'égalité de (75) est établie dans [BiH].

Démonstration. — Par hypothèse l'invariant de Seiberg–Witten est non nul ; par conséquent la dimension virtuelle de l'espace des modules est positive ou nulle soit (cf. [KM], th. 2.4)

$$d(\mathfrak{s}) = \langle e(W^+, \Phi_0), [X, \partial X] \rangle \geq 0,$$

avec $e(W^+, \Phi_0)$ la classe d'Euler relative du fibré des spineurs W^+ .

On calcule maintenant ce nombre caractéristique via la théorie de Chern–Weil. Soit A_0 la connexion de Chern du fibré anti-canonique induite par la métrique de Kähler–Einstein $\bar{g}$ définie près de l'infini. On étend A_0 et $\bar{g}$ arbitrairement au dessus de M tout entier par partition de l'unité. On en déduit une connexion spinorielle ∇_{A_0} sur W^+ telle que $\nabla_{A_0} \Phi_0 = 0$ près de l'infini. En ce qui concerne la construction de la classe de Thom U de W^+ , on se référera à [BGV], section 1.6. Soit Ψ un spineur de W^+ transverse à la section nulle et égal à Φ_0 près de l'infini. On a la formule de transgression

$$(76) \quad \text{Pf}(R(\nabla_{A_0})) - \Psi^* U = -id \int_0^1 T \left(\Psi \wedge e^{-(r^2|\Psi|^2/2) + ir\nabla_{A_0}\Psi + R(\nabla_{A_0})} \right) dr,$$

où $T : \Omega(M, \Lambda W^+) \rightarrow \Omega(M)$ est l'intégrale de Berezin et la courbure $R(\nabla_{A_0})$ a été identifiée à un élément de $\Omega^2(M, \Lambda^2 W^+)$. Comme Φ_0 est parallèle, on en déduit que l'intégrale de (76) est à support compact. Par conséquent,

$$\begin{aligned} \langle e(W^+, \Phi_0), [X, \partial X] \rangle &= \int_M \text{Pf}(R(\nabla_{A_0})) \text{vol}^{\bar{g}} \\ &= \frac{1}{4\pi^2} \int_M -F_{A_0} \wedge F_{A_0} - \left(2|W_{\bar{g}}^+|^2 - \frac{1}{2}|\text{Ric}_{\bar{g}}|^2 + \frac{s_{\bar{g}}^2}{24} \right) \text{vol}^{\bar{g}}. \end{aligned}$$

Soit (A, Φ) une solution des équations de Seiberg–Witten fournie par le théorème 2. On en déduit une connexion spinorielle ∇_A grâce à la métrique g ; alors en utilisant la décroissance de $A - A_0$ et la formule de Stokes on obtient $\int F_A \wedge F_A - F_{A_0} \wedge F_{A_0} = 0$. Par ailleurs, d'après [BiH], on a

$$\int_M \left(2|W_g^+|^2 + \frac{s_g^2}{24} \right) \text{vol}^g - \left(2|W_{\bar{g}}^+|^2 - \frac{1}{2}|\text{Ric}_{\bar{g}}|^2 + \frac{s_{\bar{g}}^2}{24} \right) \text{vol}^{\bar{g}} = 0.$$

Il en résulte que

$$\frac{1}{4\pi^2} \int_M -F_A \wedge F_A - \left(2|W_g^+|^2 + \frac{s_g^2}{24} \right) \text{vol}^g = d(\mathfrak{s}) \geq 0.$$

En utilisant la proposition 29, on obtient l'inégalité

$$0 \leq \frac{1}{4\pi^2} \int_M \left(\frac{s_g^2}{8} - 2|W_g^+|^2 - \frac{s_g^2}{24} \right) \text{vol}^g \leq \frac{1}{2\pi^2} \int_M \left(3|W_g^-|^2 - |W_g^+|^2 + \frac{s_g^2}{24} \right) \text{vol}^g,$$

avec égalité si et seulement si $W_g^- = 0$ et la métrique g est Kähler–Einstein, ce qui implique que la métrique g est en fait hyperbolique complexe. $\square$

RÉFÉRENCES

- [Bi] O. Biquard, *Métriques d'Einstein asymptotiquement symétriques*, Astérisque **265** (2000).
- [Bi2] O. Biquard, *Métriques d'Einstein à cusps et équations de Seiberg-Witten*, J. Reine Angew. Math. **490**, 129–154 (1997).
- [Bi3] O. Biquard, communication privée (déc. 2001).
- [BiH] O. Biquard, M. Herzlich, *A Burns-Epstein invariant for ACHE manifolds*, arXiv math.DG/0111218 (2001).
- [BCG] G. Besson, G. Courtois, S. Gallot, *Entropies et rigidités des espaces localement symétriques de courbure strictement négative*, Geom. Func. Anal. **5**, 731–799 (1995).
- [BG] J.P. Bourguignon, P. Gauduchon, *Spineurs, opérateurs de Dirac et variations de métriques*, Comm. Math. Phys. **144**, 581–599 (1992).
- [BGV] N. Berline, E. Getzler, M. Vergne, *Heat Kernels and Dirac Operators*, Grund. Math. **298**, Springer-Verlag.
- [BoH] H. Boualem, M. Herzlich, *Rigidity at infinity for even-dimensional asymptotically complex hyperbolic spaces*, Prep. Univ. Montpellier II **10** (2001).
- [CY] S.Y. Cheng, S.T. Yau, *On the existence of a complete Kähler metric on non-compact complex manifolds and the regularity of Fefferman's equation*, Comm. Pure. App. Math **33**, 507–544 (1980).
- [H] M. Herzlich, *Scalar curvature and rigidity for odd-dimensional complex hyperbolic spaces*, Math. Ann. **312**, 641–657 (2001).
- [KM] P.B. Kronheimer, T.S. Mrowka, *Monopoles and contact structures*, Invent. Math. **130**, 209–255 (1997).
- [KM2] P.B. Kronheimer, T.S. Mrowka, *The genus of embedded surfaces in the projective plane*, Math. Res. Lett. **1**, 797–808 (1994).
- [Ko] D. Kotschick, *The Seiberg-Witten invariants of symplectic four-manifolds, [after C.H. Taubes]*, Sémin. N. Bourbaki **812**, (1995-1996).
- [L] C. Le Brun, *Einstein Metrics and Mostow Rigidity*, Math. Res. Lett. **2**, 1–8 (1995).
- [R] Y. Rollin, *Rigidité d'Einstein du plan hyperbolique complexe*, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I **334**, 671–676 (2002).
- [R2] Y. Rollin, *Surfaces kählériennes de volume fini et équations de Seiberg-Witten*, arXiv math.DG/0106077 (2001) — à paraître dans Bull. Soc. Math. Fr.

YANN ROLLIN, DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS, UNIVERSITY OF EDINBURGH, JAMES CLERK MAXWELL BUILDING, KINGS BUILDINGS, MAYFIELD ROAD, EDINBURGH EH9 3JZ, SCOTLAND.
E-mail address: rollin@maths.ed.ac.uk